L. maculata. * Laich. Tyr. Ins. II. p. 163. 15?
L. dubia. * Brahm Ins. Kal. I. p. 178. 591?
L. sex-maculata. * Marsh. Ent. Br. I. p. 353. 30.
* Panz. Fn. G. LXIX. 21. * Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 115.
* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 9. 12. T. 26. f. 12. & III. p. 62. 108. T. 21. f. 108.
* Schæff. Icon. Tab. 6. f. 9.
Harrer Beschr. I. p. 223. 371.
Loc. *Saxonia.*

♂♀ 50. *Erratica. l)* Nov. Spec.
Loc. *Germania.*

51. *Cordifera.* * Oliv. Ent. IV. 73. p. 25. 33. T. 4. f. 41.
Loc. *America septentrionalis.*

* 52. *Interrogationis.* * Fabr. S. El. II. p. 362. 45. * Ent. S. I. II. p. 345. 35.
* Linn. Fn. Sv. n. 685. * S. Nat. I. II. p. 638. 10. * ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 10.
* Oliv. Ent. IV. 73. p. 22. 28. T. 1. f. 3. — Enc. Meth. *Lept.* n. 26.
* Payk. Fn. Sv. III. p. 121. 24.
* Panz. Fn. G. XXII. 14. ♀. * Ent. p. 272. 25.
* Cederh. Fn. Ingr. n. 297. Tab. 3. fig. G.
* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. 2:a.
* Illig. Mag. IV. p. 124. 45.
* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1057.

---

l) LEPT. ERRATICA: brevior, thoracis basi sinuatim compressa; nigra testaceo-pubescens, elytris apice rotundato, fasciis tribus rufo-testaceis, prima subbasali.

Magnitudo & fere statura *L.* 8-*maculatæ*, sed angustior, mas multo minor femina. Antennæ nigræ immaculatæ. Corpus totum nigrum, immaculatum, pube griseo-flavescenti, supra tenuiore, subtus densissima tectum, pedibus concoloribus. Thorax statura fere ut in *L.* 8-*maculata*, elytra vero multo longiora quam in illa, apice singulatim rotundata, nigra, testaceo-pubescentia, fasciis tribus dentatis rufo-testaceis; prima mox pone basin, sæpius ad suturam & ad marginem producta. Hæ fasciæ vero nonnihil variantes ut in affinibus.

DALM.