

nas fajas irregulares longitudinales claras, recordando las del *hispanicum*, mas por lo general nulas y en algún caso con una faja humeral blanca entera ó interrumpida; sin costillas ni aun vestigios de ellas; antenas y patas largas y robustas de un negro intenso. Relaciónase con *Perezi* y *Dejeani*.

D. nudipenne esp. n.—Loc. Cuenca del Riaza.

Cuerpo notablemente estrecho y alargado, más que *Ghilianii*, al cual recuerda: costilla frontal lisa, ancha y asurcada; con la media protorácica igualmente lisa, ancha y saliente, pero apenas asurcada, flanqueada por una línea muy fina pubescente, blanca y el resto granujiento y calvo sin callosidades; élitros con la sutura lisa y muy saliente, ancha, flanqueada por dos estrechas fajas longitudinales blancas y el resto calvo y rugoso, menos en el margen, finamente pubescente de blanco y en algún caso con una faja estrecha humeral del mismo color; sin costillas ni aun vestigios; patas y antenas fuertes y rojas ó pardo rojizas.

D. granulipenne esp. n.—Loc. Cuenca del Zapardiel.

Cuerpo como la especie anterior; costilla frontal estrecha y asurcada; con la costilla media protorácica, lisa y estrecha y muy profundamente asurcada, flanqueada por dos fajas estrechas pubescentes blancas y dos pequeñas zonas desiguales de pubescencia más obscura que apenas invaden las fajas longitudinales totalmente calvas, rugosas y sin callosidades; élitros con la sutura estrecha, lisa y saliente, flanqueada por dos anchas bandas de un gris claro ó blanco sucio que se obscurece al acercarse á los espacios calvos de la parte rebatida del élitro, reapareciendo la pubescencia blanca en el margen; sin costillas ni aun vestigios, pero con una muy notable conglomeración de gránulos sumamente fuertes, lisos y brillantes sobre los húmeros que se aclara hacia la mitad de los élitros; carácter éste que la aisla por completo de sus similares *Ghilianii*, *nudipenne*, etc.; patas y antenas fuertes, rojas ó pardo rojizas.