

*attenuata*. 12. L. elytris attenuatis, flavis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 639. 13.* *Fn. Sv. 688.*

*Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.*

Habitat in Europa.

Fasciae elytrorum variant, in primis anterior. Interdum plane deest, interdum interrupta, interdum integra.

*4 fascia-* 13. L. nigra, elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis, ta. nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 639. 12.* *Fn. Sv. 687.*

*Cerambyx fasciatus. Scopol. carn. 172.*

Habitat in Europa.

Foeminam praecedentis credit *Scopoli.*

*sex gut-* 14. L. nigra, elytris maculis tribus flavis.

*tata.* Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Corpus statura L. attenuatae, totum nigrum, elytris foliis maculis tribus flavis, quarum anterior baseos ad futuram, reliquae duae in medio.

*sericea.* 15. L. viridi-coerulea, elytris subfastigiatis. *Linn. Syst. Nat. II. 638. 8.* *Fn. Sv. 683.*

*Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.*

Habitat in Europa.

*collaris.* 16. L. thorace globofo, abdomineque rubris, elytris nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 639. 16.* *Fn. Sv. 691.* *Scop. carn. 159.*

*Stenocorus niger, thorace rubro. Geoff. Inf. I. 228. II.*

*Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.*

Habitat in Europa.

*virginea.* 17. L. thorace globofo, nigro, elytris violaceis, ab domine rufo. *Linn. Syst. Nat. II. 639. 15.* *Fn. Sv. 690.*

Leptura nigra, elytris coerulecentibus, toto abdo mine rubro. *Gadd. Diff. 26.*

*Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.*

Habitat in Europa.