

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1. tab. 153. fig. 4.

Herbst Arch. 9. tab. 25. fig. 6.

Habitat in Europa australiori.

Thorax variat immaculatus & macula laterali rufa. Elytra apice emarginata.

*Lundii.*

25. C. thorace spinoso sanguineus antennis elytrorum apicibus abdomine pedibusque nigris. Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund. Statura & magnitudo praecedentis. Antennae breves, nigrae. Caput sanguineum mandibulis nigris. Thorax gibbus, spinosus, sanguineus, immaculatus. Scutellum atrum. Elytra laevia, sanguinea, apice late atra. Pectus sanguineum. Abdomen nigrum tuberculo acuto, rufo inter pedes secundi paris. Pedes atri femoribus subclavatis.

*Desfontai-* 26, E. thorace spinoso sanguineo nigro maculato nii. ater elytris sanguineis basi apiceque atris, antennis longissimis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines. Statura omnino C. Kaehleri. Caput atrum antennis longissimis. Thorax spinosus, sanguineus maculis baseos medioque interdum lineis nigris. Elytra laevia macula baseos parva, apicis magna atris. Corpus atrum immaculatum.

*succinctus.* 27. C. thorace bispinosa rugosa, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. Linn. Syst. nat. 2. 627. 32. Mus. Lud. Ulr. 72. Cerambyx fusco castaneus. Degeer Inf. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.

Oliv. Inf. 68. tab. 7. fig. 43.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.

Habitat in America, Brasilia.