

intra apicem late, sed minus profunde, at juxta basin transversim, anguste nec non profunde impressus, in medio disci utrinque nodulo signatus, præterea intra basin utrinque carinula obliqua angusta et altera latiore nec non obsoletiore et magis nitida pone medium instructus. Scutellum latiusculum, subtriangulare, apice obtusum, disco impressum, pilis fuscis prostratis densissime obductum, nigrum; margine laterali nudo, nitido. Elytra basi thoracis dimidio latiora, basi late sed haud profunde emarginata, humeris productis, rotundatis; lateribus parallela, carinato-marginata, postice parum angustata, apice concinne dehiscentia, singulatim acute rotundata, supra convexa, intra humerum longitudinaliter parum profunde impressa, latera versus præcipue postice cylindrica, undique æqualiter confertim cribellata, nigra, sub-nitida, pilis brevibus flavis condensatis fasciculatim dispersis variegata, præterea pilis rigidis fuscis longis parce obsita. Corpus subtus cylindricum, minute punctatum, nigrum, sub-nitidum, thorace subtus pectoreque dense fusco-villosum; abdomine pube grisea erecta et pilis longis rigidis fuscis vage immixtis parce vestitum; ano emarginato. Pedes longiusculi, validi, nigri, punctati, sub-nitidi, sat dense pilosi.

497. *SAPERDA Scovitzii* MIHI. Tab. IX. f. 5.

Picea; fronte, thorace, corpore subtus elytrorumque margine laterali antico densissime flavo-villosis; elytris valde attenuatis, scrobiculatis, sub-nitidis, vittis tribus albidis sub-interruptis in singulo decoratis.

Longit. 8—13 lin. Lat. $2\frac{1}{6}$ — $4\frac{5}{8}$ lin.

Statura omnino *Saperdæ* *Carcharitis* Fabr. elytris tamen magis attenuatis etc.

Caput parvum, productum, valde declinatum, nigrum, confertissime exarato-punctatum, disco longitudinaliter obsolete canaliculatum, vertice convexum, parce flavo-pubescentibus, lateribus pone oculos sub-gibbum, ibique pube flava densa e pilis longis rigidis dense immixtis obtectum; fronte late et sat profunde impressa, antice densissime flavo-villosa; inter antenas lævius, paullo nitidum. Oculi mediocres, modice prominenti, aterrimi. Antennæ corpore parum breviores, validæ, nigrae, apice nonnihil dilutiores, pube atro-fusca dense obductæ; articulo basali maximo, dense punctulato. Thorax transversus, longitudine duplo fere latior, lateribus ampliato-rotundatus seu gibbus, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, disco fornicatus, intra apicem transversim late et sat profunde impressus, undique crebre punctatus nec non densissime flavo-villosus. Scutellum sub-quadratum, postice obtuse rotundatum, supra planum, pilis flavis longioribus prostratis totum dense tectum. Elytra thorace multo latiora, apicem versus oblique subulatim attenuata, apice dehiscentia, singulatim acute rotundata, basi utrinque interne oblique truncata, humeris productis, ampliato-rotundatis; supra deplanata, sub-nitida, intra humerum et pone scutellum leviter impressa, ante medium nigra vel picea, postice dilutiora, pone medium utrinque vitta lata rufo-fusca, ubique confertim subseriatim profunde cribellata, basi parce sed sutura tota dense atro-fusco-pilosa; lateribus ante medium densissime flavo-villosa, postice glabra, carinato-marginata; in singulo elytro vittis tribus sub-interruptis, linearibus, apice confluentibus, e pilis brevibus, flavo-albidis, condensatis, ornata. Corpus subtus postice attenuatum, cylindricum, ubique densissime flavo-villosum;

segmento anali apice rufo , leviter emarginato , intra apicem profunde et late excavato. Pedes robusti, nigri, minute punctati , inæqualiter dense flavo-villosi ; tarsis ferrugineis.

498. *SAPERDA argentata* MENÉTRIES. Tab. IX. f. 6.

Nigra , opaca , dense cinereo-sericea , sub-villosa ; antennis maculatis ; thorace vittis tribus lanuginosis cinereo-flavis ; elytris depressis , vage punctatis , densissime cinereo-pubescentibus , apice singulatim sub-acuminatis.

Longit. $6\frac{1}{2}$ lin. Lat. $2\frac{1}{2}$ lin.

MÉNÉTRIES Catalogue raisonné pag. 227. n. 1032.

Saperdæ hirsutulæ valde affinis et similis, tamen plus duplo major , præsertim latior ; thorace brevior , elytris plerumque magis attenuatis præcipue differt.

Caput nigrum , opacum , creberrime minute punctatum , vertice convexum , inter oculos depressum , parce pubescens, pone oculos et subtus dense flavo-albido-villosum. Oculi magni , parum prominuli , aterrimi , pilis pallidis , longis , dense cingulati. Antennæ longitudine corporis , tenues , fusco-nigræ , griseo-annulatæ , dense pubescentes , pilis nonnullis rigidis , nigris adpersæ. Thorax brevis , longitudine plus dimidio latior , basi apiceque truncatus , reflexo-marginatus , lateribus dilatato pulvinatus , cylindricus , niger , opacus , undique confertissime , minute sed profunde punctatus , supra parce , subtus densissime cinereo-villosus , in disco ante medium transversim late sed haud profunde impressus, vittis tribus cinereo-flavo-lanuginosis angustis signatus. Scutellum latiuscu-