

Kopf, Halsschild und Schildchen wie bei den vorigen Arten tomentirt. Das graugelbe Toment der nur auf der vorderen Hälfte länger abstehend behaarten Flügeldecken gleichmässig vertheilt, bei nicht ganz wohl erhaltenen Exemplaren undeutlich fleckig (*Ag. acutipennis* Muls. = *pyrenaea* Bris.). — Long. 15—23 mm. Syn. *Ag. decora* Kryn. — Süd-Europa, Krim, Kleinasien, Syrien . . . . . *Cynaræ* Germ.

5' Das dritte Fühlerglied schwarz, bis zu drei Viertel oder vier Fünftel, das vierte bis über die Hälfte, die folgenden etwa bis zur Hälfte weissgrau geringelt, gegen die Basis nicht oder kaum röthlich durchscheinend. Erstes Fühlerglied aussen ohne weissliche Behaarung, das dritte bis fünfte oder sechste an der Innenseite mit zahlreicheren Wimperhaaren. Kopf, Halsschild und Schildchen wie bei den vorigen Arten tomentirt; der Halsschild zwischen der Mittelbinde und den Seitenbinden anliegend dünn gelblichgrau behaart. Flügeldecken mit grober, ungleichmässiger Punktirung und fleckig vertheiltem grauem, graugelbem oder bräunlichgelbem Toment. Fühler im Allgemeinen auffällig dünn, jedoch in der Dicke variabel und bei einer im Caucasus vorkommenden Rasse (var. *Lederi* m.) doppelt so dick als bei der Stammform. Stücke aus dem südlichen Frankreich, aus dem Elsass und aus der Schweiz stehen in Bezug auf die Dicke der Fühler in der Mitte zwischen var. *Lederi* und der Stammform. Long. 13—16 mm. Syn. *Ag. angusticollis* Gyllh. — Nord- und Mittel-Europa, Caucasus . . . . . *lineatocollis* Donov.

4' Die Seiten der Brust sehr dicht weiss oder gelblichweiss tomentirt, die übrige Unterseite nur mit feiner und dünner grauer Behaarung. Schwarz, die Flügeldecken mit Bleischimmer; die Stirn und die Seiten des Kopfes, eine Mittelbinde über den Scheitel und Halsschild, zwei seitliche Längsbinden auf dem Halsschilde und das Schildchen dicht weiss oder gelblichweiss tomentirt. Fühler schwarz, innen fast bis zur Spitze lang bewimpert, ihr erstes Glied aussen ohne weissliche Behaarung, ihr drittes Glied nur an der Wurzel, die folgenden bis zur Hälfte weissgrau geringelt. Flügeldecken vorne, sowie der Kopf und Halsschild mit langabstehenden schwarzen Haaren, im Uebrigen gleichmässig, ziemlich dünn und fein weissgrau tomentirt. Eine durch die dicht gelblich oder weiss tomentirten Seiten der Brust leicht kenntliche Art. Long. 10—15 mm. Syn. *Ag. trivittata* Gebl. — Ungarn, Griechenland, Süd-Russland (Sarepta), Sibirien  
*maculicornis* Gyllh.

3' Flügeldecken mit weiss tomentirter Nahtbinde.

Schwarz, die Flügeldecken dunkel erzfarbig, dunkel olivengrün oder dunkelblau. Die Stirn und die Seiten des Kopfes, eine Mittelbinde über den Scheitel und Halsschild, zwei seitliche Längsbinden auf dem Halsschilde, das Schildchen und die Naht der Flügeldecken dicht weiss oder gelblichweiss tomentirt. Fühler innen bis auf die letzten Glieder dicht schwarz bewimpert, schwarz, das dritte bis fünfte Glied oft gegen die Wurzel röthlich, ihr drittes und viertes Glied bis über die Hälfte, die folgenden