

lolla, margineque apicis flavo-tomentosis. — *Corpus subtus* tenue punctatum, macula laterali pectoris abdominisque segmentorum margine flavo-tomentosis. — *Pedes* longi, femoribus clavatis, rugulosis, tarsis piceis.

Habit. in floribus montium altaicorum.

17. *CLYTUS Hircus*.

Niger, thorace globoso, striolis 2 albis; elytris fuscis, apice obscurioribus, fasciis 2 arcuatis albis.

Longit. $5\frac{1}{2}$ lin. *lat.* $1\frac{1}{2}$ lin.

Tenue albido-pubescens, supra opacus, subtus nitidulus.

Caput confertim punctatum, fronte depressa; antennae breves, piceae. — *Thorax* antice posticeque truncatus, lateribus dilatatus, supra parum convexus, confertissime punctulatus, striolis 2 disci sub-arcuatis, albis. — *Elytra* thorace parum latiora et $2\frac{1}{2}$ longiora, linearia, apice singulatim rotundata, supra parum convexa, subtilissime alutacea, punctulo humerali obsoleto, fascia a scutello ellyptice ad humerum excurrente, alteraque obliqua, antrorsum arcuata in medio, albo-tomentosis. — *Corpus subtus* dense punctulatum; pedes longi, femoribus clavatis, basi ferrugineis, tibiis fuscis, tarsis piceis.

Habit. cum priore.

18. *PAROPSIS 12-pustulata*.

Ob-ovata, atra, elytris maculis 6 flavis (in vivis rufis?).

Longit. 4 lin. *lat.* 3 lin.

Nitida, glabra.