

(feminae?) cylindrico, ano anguste canaliculato. — *Pedes* breves, pubescentes.

Habitat in montibus altaicis rarius.

14. SAPERDA sulphurata.

Nigra, thorace striis 2, elytris punctis 4 sulphureis, pedibus testaceis.

Longit. 3½ lin. latit. ¾ lin.

Linearis, nitidula, griseo-pilosula.

Caput punctulatum, lineis 2 obliquis verticis fronteque depressa sulphureo-tomentosis. — *Oculi magni, prominuli; antennae corpore longiores, cinereo-pubescentes.* — *Thorax* capite angustior, longitudine non latior, cylindricus, punctatus, basi constrictus, striis 2 lateralibus maculaque ante scutellum sulphureo-tomentosis. — *Scutellum transversum sulphureo-tomentosum.* — *Elytra* thorace latiora et 4-plo longiora, ad apicem angustata, apice emarginata, supra profunde punctata, punctis 4, magnis, seriatim dispositis, sulphureo-tomentosis (anterioribus saepius detritis). — *Corpus subtus* medio tenuie, ad latera densius sulphureo-tomentosum. — *Pedes* longiusculi, laete flavo-testacei.

Habitat in Salice propre Barnaul et Smeinogorsk.

15. SAPERDA interrupta.

Nigra, pallido-tomentosa, thorace punctis 6, elytris vitta interrupta denudatis.

Longit. 4½ lin. lat. 1¼ lin.

Affinis *S. scalaris*; differt magnitudine et pubescencia. — Tota sub-nitida, pallido-tomentosa.

Caput punctatum, fronte depressa, oculis magnis, antennis corpore paullo longioribus, basi pilosulis, apice tenuiter cinereo-pubescentibus. — *Thorax* structurae *S. sulphuratae*, supra punctatus, punctis magnis, 4 dorsalibus quadratim dispositis, subconfluentibus, 2 lateralibus nigris. — *Scutellum transversum.* — *Elytra* thorace latiora et 6-plo longiora, linearia, apice singulatim rotundata, supra minus confertim punctata, vitta laterali, ultra medium fasciolis 2 interrupta, nigra. — *Corpus subtus* tenuissime punctulatum, minus tomentosum; *pedibus* longiusculis.

In sylvis Sibiriae 3 specimina lecta, duo virescenti-tomentosa, tertium cinereo-tomentosum; abdome crasso, ano canaliculato (femina?).

16. CLYTUS Ibex.

Niger, thorace globoso, ruguloso, elytris striola transversa, fasciis 2 angulatis apiceque rotundato flavis.

Longit. 6—7½ lin. lat. 2—2½ lin.

Tota tenuie albido-pubescentes, supra opaca, subtus nitidula.

Caput punctatum, fronte convexa, 4-carinata, carinis intermediis apice connexis. — *Antennae* breves, apice piceae. — *Thorax* transversus, basi apiceque truncatus et flavo-tomentosus, supra globosus, anguste rugulosus, — *Scutellum transversum*, rotundatum, margine flavo-tomentosum. — *Elytra* thorace parum latiora et 2½ longiora, linearia, postice angustiora et singulatim rotundata, supra convexa, rugulosa, striola antica transversa, fascia a scutello pone suturam usque ad medium descendente, inde angulata, transversa, altera a priori ultra medium in ipsa sutura decurrente, tum cum illa para-