

Sutura et margo postice anguste nigri.

Forsan mera varietas.

5 , minuta m.

Nigra , thorace rotundato capiteque sub-punctulatis , elytris violaceis , punctatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ lin. ; lat. 4 lin. Nitida , tenue albido-pubescentes.

Caput deplanatum , tenue punctulatum , inter antennas canaliculatum ; oculis globosis. Antennæ longæ , graciles , pubescentes. Thorax antice angustatus , truncatus , lateribus rotundatus , basi bisinuatus ; supra convexus , vage et subtilissime punctulatus , medio longitudinaliter , ad apicem transversim impressus. Scutellum albo-tomentosum. Elytra thorace multo latiora , linearia , apice singulatim rotundata ; supra parum convexa , vage et profundius punctata medio subimpressa , humero prominulo. Corpus subtus dense punctulatum ; pedes longi , graciles. 4.

Punctura , structura thoracis etc. satis differt a P. virginea.

6 , 4-maculata.

7 , smaragdula.

8 , strigilata.

9 , 6-maculata Dej.

10 , trifasciata (6-maculata Sch.)

11 , variabilis m.

cum multis varietatibus.

N B. Leptura striolata m. (Mémoires de Moscou V.

p. 330) videtur varietas P. variabilis , in Dauria æque variantis elytris pallidis , basi , sutura , vitta lata disci , striolisque nigris.

12 , virginea.