

- taeniatus. 345. C. thorace spinoso, elytris nigricantibus: fasciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. *Lepeck. it. 2. p. 299. t. 11. f. 32.*
Habitat in Sibiriae petrarum fissuris.
- aculeatus. 346. C. nigricans antennis longissimis: spinis tribus introrsum armatis. *Rozier journ. de phys. 1. p. 26. t. 1. f. C.*
Habitat in America.
- arenarius. 347. C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. n. 168.*
Pod. mus. graec. p. 34. Cerambyx pedestris.
Habitat in Carniolia.
- timidus. 348. C. niger, elytris flavescentibus: maculis binis atris. *Scop. ent. carn. n. 171. ann. hist. nat. 5. p. 99. n. 67.*
Habitat in Carniolia, e longinquo hostem fugiens, et sub umbella se recipiens:
- adsperfus. 349. C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 95. n. 55.*
Habitat in Carniolia, tristi affinis, sed minor.
- ovalis. 350. C. ovatus fuscus, elytris integris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 206. n. 10.*
Habitat in Gallia.
- cruentatus. 351. C. griseus, thorace spinoso, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis, antennis longis aculeatis. *Degeer inf. 5. p. 107. n. 8.*
Habitat in India, rubo affinis, an hujus tribus?
- sinensis. 352. C. niger, thorace spinoso, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. *Degeer inf. 5. p. 109. n. 10.*
Habitat in Sina, tres lineas ultra pollicem longus.
- tigrinus. 353. C. ex fusco griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctatisque fuscis sparsis, antennis longioribus. *Degeer inf. 5. p. 114. n. 15. t. 14. f. 6.*
Habitat in Pennsylvania, 11 lineas longus.
- peninsula. 354. C. thorace subspinoso, elytris truncatis ex flavo griseis: fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. *Degeer inf. 5. p. 114. n. 16. t. 14. f. 7.*
Habitat in Pennsylvania, dimidium pollicem longus.