

*thoraxque confertissimè granuloso punctata, rostro fossula lineari. Thorax lateribus ampliatis, plaga discoidali obscuriore subrhombica elytra ruguloso-striato-punctatis. — Long. 10 mill. ; lat. 4 mill. — Madrid.*

9. *Cneorhinus lateralis. — Oblongo-ovatus, niger, punctato-subgranulosus, densè squamosus; supra squamulis griseo-aurulentis; lateribus infraque viridi nitentibus; ore, antennis pedibusque setulosus; elytris striato punctatis. — Long. 9 mill. ; lat. 4 mill. — Galice?*

10. *Dorcadion Perezi. — Caput vittis tribus albidis, antennis nigris, Thorace carina dorsali albido tenuissimè limbata, lateribus canescente nigroque trivittatis, scutellum nigrum, nitidum. Elytra sutura vittaque marginali alba, in apice uncinata, macula sagittiformi suturæ conjuncta. — Long. 14 mill ; lat. 5 mill. — Guadarrama.*

— M. H. Lucas fait connaître un Mémoire intitulé : *Observations sur un nouveau genre de l'ordre des Coléoptères (Stenomera) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique.* Après de nombreuses considérations générales sur la place que doit occuper ce genre dans l'ordre des Coléoptères, et après avoir démontré qu'il doit entrer dans la tribu des *Clérites*, l'auteur en donne la caractéristique suivante :

GENUS STENOMERA. — *Caput longius quàm latiùs, anticè transversum excavatum. Labium parvum, multò longius quàm latiùs, anticè fortiter transversum excavatum. Mandibulæ parvæ, proeminentes, validæ, anticè acutæ sed non emarginatæ. Palpi maxillares elongati, validi, primo articulo maximo, secundo parvo, tertio majore, in medio inflato anticèque truncato. Palpi labiales breves, exiles, articulo terminali sat magno, in medio inflato. Oculi inflati, proeminentes, rotundati. Antennæ elongatæ, primo articulo sat magno, secundo brevi, subsequentibus (3, 4, 5, 6 et 7) minimis, confertissimis, 8, 9, 10 et 11 dentato-pectinatis in mare, 8 et 9 tantum den-*