

Ueber *Meloë Olivieri* Chevrolat und sechs neue Longicornen aus Klein-Asien.

Beschrieben von

Major z. D. Dr. L. von Heyden.

(Hierzu Taf. I, Fig. 2—4.)

Durch die Vermittelung meines verehrten Freundes Oberst Schultze in Detmold erhielt ich von Herrn Geometer Carl Preifs in Ludwigshafen a. Rhein eine Anzahl Coleopteren aus Klein-Asien zur Bestimmung zugesandt. Sie wurden von Prof. Manissadjian in Merzifun im Vilayet von Kastamuni bei dem Orte gleichen Namens, sowie bei Amasia und Mardin im Vilayet Siwas in Klein-Asien gesammelt, in Gegenden, die zuvor wissenschaftlich zum Theil noch nicht durchforscht waren. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß sich in der Ausbeute ausgezeichnete Coleopteren fanden, nicht allein seither verschollene, sondern auch 6 noch unbeschriebene *Longicornia*. Zu erwähnen ist ferner die interessante *Osphrantheria coerulescens* Redtb. (*Longic.*) von Mardin. —

Die hochinteressante *Meloë Olivieri* Chevrolat ist in Guérin, Mag. Zool. 1833, pl. 57 nach einem vom alten Olivier im „Orient“ gefundenen Exemplare beschrieben und sehr kenntlich colorirt abgebildet. Die seither nicht wieder gefundene Art steht durch die Farbe der Tomentirung ganz isolirt da. Der Kopf ist schneeweiß mit vielen glänzend schwarzen Tuberkeln, das Halsschild ist schwarz, tuberkulirt, mit gelber Behaarung zwischen den Tuberkeln, die Flügeldecken sind schwarz, fleckig gedrängt, gelb tomentirt, an den Seiten noch heller. Der Hinterleib ist oben schwarz, mit einer weißen Längsbinde in der Mitte und fleckig gelb tomentirt. Da die schwer zugängliche Beschreibung Chevrolat's nur in wenig Händen sein wird, so gebe ich hier die Diagnose im Abdruck wieder:

Flavescenti-sericeo ater. Capite albo-argenteo, linea longitudinali impresso, punctis eminentibus nigris signato. Thorace transverso, latescente apice, subplano et tuberculato. Tibiis nigris, flavo supra marginatis cum spinis duabus rectis in extremitate, unguiculis bifidis, aequalibus. — Long. 21½ mill., larg. 11½ mill. — Orient. — Das vorliegende Exemplar von Amasia.

Beschreibung der neuen *Longicornia*.

1. *Hesperophanes Preissi* Heyden. — *Obscure fuscus. Corpore toto uniformiter laxè pubescente, nusquam nebuloso, pilis*

longis erectis undique tecto ab omnibus speciebus cognitis differt. Capite, thorace, scutello fortius flavido tomentoso pubescentibus, rugulis laevibus undique tectis, interstitiis fossulato pupillatis, pupillis pilum longum flavescens decumbentem gerentibus. Antennis brevioribus, robustis, articulis usque ad apicem laxè hirsutis. Thorace fere globoso, elevationibus dorsi nullis, postice perparum angustato, marginibus anticis posticisque distincte elevatis. Elytris basi dense fortiter, deinde ad apicem usque decrescente tenuiter disperseque ad apicem fere evanescente punctatis, inde fere lucidis, interstitiis punctorum laevigatissimis, punctis omnibus pilum longum flavum aequaliter decumbentem gerentibus. Sutura in apice fere rectangulariter truncato non denticulato. Dorso elytrorum medio depressiusculo. Pedibus magis rufo fuscis, pilosis pilisque erectis. — Long. 22 mill.

Femina unica, ut reliquae species, collectioni meae dono data a Dom. Preifs, in cujus honorem hanc speciem nominavi. — Mardin Asiae minoris.

2. *Dorcadion Schultzei* Heyd. — *Ex affinitate D. divisum Germ., sed vittis dorsali humeralique integris. Antennis pedibusque nigropiceis, tibiis rufo tinctis, griseo tomentosis. Maculis duabus occipitis trigonalibus, antequè basin antennarum macula fusco-tomentosis. Thorace lateribus dente non acuto, in dorso vittis duabus fusco-tomentosis linea lata mediana grisea divisis. Elytris fusco-tomentosis, sutura vittis dorsali angustiore humeralique latiore post basin et post medium conjunctis, laterali lata griseis, basi tuberculis parvis nigris ceterum omnibus minutis nigro-irroratis, tomento ad suturam densiore, elytris in apice distincte rufis.*

♀. *Parum latiore, tomento dilutiore, ad suturam griseam linea fusco-tomentosa in maculis dilacerata.*

2 ♂ 1 ♀ in collectionibus meae et Dom. Preifs.

Long. 11½—13 mill. — Mardin Asiae minoris.

In honorem D. Schultze, tribuno militum, cujus auxilio haec species paravi, nominatum.

3. *Dorcadion Preissi* Heyd. — *D. Piochardi* Krtz. *valde affinis, sed multo major, robustior, vitta nivea humerali latissima primo intuitu distinctissima. Antennis pedibusque rufis, albo tomentosis. Capite thoraceque albo tomentosis, maculis duabus triangularibus occipitalibus, antice in frontem productis nigro-tomentosis, capite in medio canaliculato denudato. Thorace vittis duabus medianis aequalibus postice angustioribus (extus non angulatis ut in D. Piochardi) nigro-tomentosis, vitta discali albida in medio perparum canaliculata. Elytris sutura nivea, linea juxta suturali nigerrimo-*