Parmena bicincta, *Küster.*

O. oblongo-subovata, rufo-picea, supra fusco-pubescens, pallide pilosa; thorace punctulato; elytris vage punctatis, lineis duabus flexuosis albidis, subtus pedibusque griseo-pubescentibus; antennis tarsisque obscure rufis, tibiis posterioribus apice densissime flavo-ciliatis. — *Long.* 3—3½‴, *lat.* 1¼—1⅖‴.

In Grösse und Form mit P. hirsuta übereinstimmend, aber mit ganz anderer Punktirung und ausserdem durch den dünnen Filzüberzug der Oberseite, sowie die beiden Querlinien der Flügeldecken verschieden, von P. unifasciata unterscheidet sie sich durch gestreckteren Körper, etwas häufigere Punkte der Flügeldecken, die nicht gezackten hellen Querlinien derselben, so wie die den übrigen Theilen gleiche Färbung des von den Querlinien eingeschlossenen Raumes. Der Körper ist gestreckt eiförmig, gewölbt, mattglänzend, etwas röthlich pechbraun, oben mit dünnem erdbraunem Toment bekleidet, überall sparsam mit langen, gerade abstehenden weisslichen weichen Haaren besetzt. Die Fühler sind kürzer als der Körper, bräunlichroth, braun pubescent, mit vereinzelten weisslichen abstehenden Härchen besetzt. Kopf quer, zwischen den Fühlern flach eingesenkt, mit undeutlicher Längslinie, grob

zerstreut punktirt, der Vordertheil sanft gewölbt. Brustschild kaum so lang als breit, fast walzig, vorn gerade abgestutzt, un den Seiten etwas erweitert, mit einem kleinen Höcker hinter der Mitte, hinteu etwas schräg einwärts laufend, daher die Hinterecken stumpfwinklig, Basis beiderseits kaum ausgerandet, der Rand schmal erhöht; die Oberfläche sanft gewölbt, mässig dicht und etwas fein punktirt, in der Mitte verflacht, an den Seiten mit stärkeren Punkten. Schildchen quer, rundlich, uneben. Flügeldecken länglich eiförmig, gewölbt, zerstreut punktirt, die Punkte hier und da wenig regelmässige unterbrochene Längsreihen bildend, vorn grösser und tiefer, hinten allmählig kleiner, das Toment ist dünn, so dass die Grundfarbe durchscheint, vor der Mitte ist eine, aus gelbweissen Härchen gebildete buchtige Querlinie, hinter der Mitte eine ähnliche, der von beiden eingeschlossene Raum beträgt ungefähr ¼ der ganzen Länge und ist mit der übrigen Fläche gleichfarbig. Unterseite zerstreut punktirt, mit greiser Pubescenz wie mit einem Reif überzogen. Beine etwas stark, die Schenkel keulenförmig, schwarz, greis pubescent wie die Schienen, diese nach unten braunroth, vor der Spitze aussen und innen, besonders aber aussen sehr dicht gelb gewimpert, die Härchen stark weisslich glänzend, Tarsen braunroth, dünn greis pubescent.

Im unteren Dalmatien bei Cattaro und Ragusa von mir gefunden.