

fuligi- 28. C. thorace subspinoso niger, elytris cinerascentibus, an-
nator. tennis brevioribus.

Habitat in Germania. P. Forskåbl.

*Minor Ape; totus ater. Antennæ vix corporis longitu-
dine. Thorax rotundatus, parce spinosus. Elytra mi-
nus acuta, rore cinereo folido inquinata.*

coquus. 29. C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis fulcatis
atris antice ferrugineis, antennis mediocribus.

Habitat in Canada. Kalm.

*Spinae thoracis villosi petius digitis quam oculis obser-
vantur.*

cursor. 30. C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine linea-
que nigris, antennis mediocribus.

*Fn. svec. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tri-
bus nigris longitudinalibus.*

Habitat in Europa.

kähleri. 31. C. thorace spinoso niger, thorace elytrisque macula
magna nigra.

Habitat in Italia. M. Kähler.

*Magnitudo media. Corpus ♂ artus nigra. Thorax san-
guineus macula in tergo magna, rotundata, nigra.
Elytra sanguinea: macula magna, ovali, nigra, utro-
que elytro communi, a medio ad apices fere extensa.
Femora apice emarginata, acuta. Antennæ vix cor-
poris longitudine.*

inquisi- 32. C. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis,
tor. antennis corpore brevioribus.

*Fn. svec. 485. Cerambyx cinereus nigro nebulosus, an-
tennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*

Frisch. ins. 13. t. 14.

*β. Fn. svec. 486. Cerambyx cinereus coleoptris fasciis
duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus,
thorace spinoso.*

Habitat in Europa.

fur. 33. C. thorace spinoso gibbosso, coleoptris ovatis: fascia
duplici albida, antennis filiformibus mediocribus.

*Fn. svec. 487. Cerambyx testaceus, elytrorum fascia
duplici albida, thorace spinoso.*