

## OEDEMERIDAE.

108. *Xanthochroa barbara*, n. sp. (♂). — Long. 9,5 mm., lat. 2,2 mm. — *Deplanata*, parum nitida, sordide flava, fronte, coleopteris tantum ad latera abdomineque ano excepto infuscatis. Caput nitidum, punctis minutis sparsum. Oculi majusculi, prominuli. Antennarum articulus 3<sup>us</sup> primo aut quarto paullo longior. Pronotum aequè longum ac latum, antice obtuse ampliatus, cordatum, basi et apice foveolatum, sat dense punctulatum. Coleoptera pronoto circiter duplo latiora, capite cum pronoto fere triplo longiora, subtiliter dense granulata, costulis tribus vagissimis ornata, sutura ac lateribus marginatis. Pedes parum elongati, femoribus posticis apicem quarti segmenti abdominis attingentibus. Pygidium apice summo emarginatum, ultimum ventrale segmentum in longitudinem praecedentem parum superans. Segmentum anale triangulariter profunde fissum, versus basin medio lineatum lamellis in facie cochlearis connatis. — *Femina invisita*.

*Prope Icosium Africae Minoris, e ligno emortuo Pini halepensis elata.*

Un seul ♂, éclos le 3 août d'une branchette de Pin d'Alep recueillie au « Bois de Boulogne » près Alger et conservée au Laboratoire de la Station de Recherches forestières du Nord de l'Afrique. C'est à mon préparateur, M. Ch. GRANGER, que revient le mérite d'avoir élevé et recueilli cet intéressant insecte.

Très voisin de *X. gracilis* Schm. (dont M. le D<sup>r</sup> CHOBOUT a bien voulu me communiquer un spécimen ♂). Distinct par la forme moins allongée, les antennes et les pattes plus courtes. Le pronotum légèrement plus rétréci vers la base, les yeux un peu moins rapprochés sur le front, et, à première vue, par les élytres entièrement clairs, sauf la marge latérale.

Le genre *Xanthochroa* n'avait pas encore été signalé en Barbarie.

## CERAMBYCIDAE.

109. *Pogonochaerus Caroli icosiensis*, n. subsp. — Long. 4,5-7,5 mm. — *Proles barbara*, a typica statura minore, coleopteris pube albata confertissima dimidium basale epipleuris exceptis occupante ut stragulatis, penicillisque nigris costulae dorsalis nullo modo pectinatis discrepans.

*E ligno emortuo Pini halepensis prope Icosium quum aestas autumnescit elatus.*

« Bois de Boulogne » près Alger, une série d'exemplaires éclos en septembre et octobre de branchettes de Pin d'Alep mises en bocal.

Constamment distinct des *Pogonochaerus Caroli* d'Europe par la


densité de la pubescence qui couvre la moitié antérieure des élytres, s'arrête en arrière suivant un contour trapézoïdal très précis et voile à peu près complètement la ponctuation. De plus, les fascicules noirs qui ornent la costale interne, et notamment le fascicule postérieur, au lieu de s'allonger en peignes, restent toujours en forme de pinceaux.

Le *P. Caroli* Muls. n'a pas encore été signalé dans le Nord de l'Afrique, où le *P. Perroudi* Muls., qui vit également dans le Pin d'Alep, est connu depuis assez longtemps (cf. *Ann. Soc. ent. Fr.* [1895], Bull., p. 316).

**Description d'un *Aphodius* nouveau du Maroc** [COL. SCARABAEIDAE]

par A. THÉRY.

***Aphodius* (*Volinus*) *Boiteli*, n. sp.** — Long. 4,5-5 mm. — Noir, avec les élytres testacés, ornés de taches noires allongées sur les interstries; tibias bruns à l'extrémité; subcylindrique assez bombé, peu allongé, ayant assez exactement la forme et l'aspect de l'*A. (Volinus) lineolatus* Ill.



*A. Boiteli*, n. sp.

Épistome échancré mais peu profondément, avec les bords relevés en avant, les angles antérieurs très arrondis, densément et un peu rugueusement ponctué, avec un tubercule écrasé peu saillant et une carène frontale bien visible. Pronotum luisant, assez fortement ponctué, les points de dimensions variables; nettement rebordé à la base. Écusson à ponctuation indistincte. Élytres lisses, brillants, imponctués, à stries fortes et nettement ponctuées, l'interstrie juxtasutural noir sur toute sa longueur, le suivant sans taches sauf quelquefois à l'extrémité, les suivants plus ou moins ornés de taches noires ne débordant pas les stries et se prolongeant plus

ou moins le long de celles-ci, formant généralement en avant de vagues fascies obliques, réunies en groupe au sommet où elles circonscrivent presque complètement un petit espace clair. Dents des tibias antérieurs extrêmement développées, l'apicale plus longue que les autres.

Cette espèce se place à côté d'*A. lineolatus* Ill. dont elle a la forme