plus saillante que les autres ; les gros points des interstices sont moins gros et plus serrés. Le prosternum est concave au milieu et se termine par une courte pointe ; le mésosternum est faiblement concave ; la saillie intercoxale est large, obtusément arrondie. Les tarses sont courts, épais, diminuant un peu d'épaisseur vers l'extrémité.

Ce curieux Insecte a 8 mill. de longueur. Il est entièrement d'un roux cannelle. Il provient de Hué, et m'a été obligeamment communiqué par notre collègue et ami M. A. Sallé.

Je lui donne le nom de **Ziælas insolitus.**

— M. M. Pic, de Digoin, communique quelques espèces et variétés nouvelles de Longicornes, recueillies par M. C. Delagrange dans son voyage dans le nord de la Syrie en 1891 :

1. Toxotus ? insitivus, v. **latus.** — Grand et large ; tout le corps revêtu d'un duvet jaune ou cendré sur fond testacé ou rougeâtre, avec le prothorax et la tête noirâtres. Antennes et pattes d'un jaune ou rouge testacé, moins les genoux qui sont plus ou moins noirs. Prothorax assez long et étroit, avec une épine courte et des sillons (médian et postérieur) profonds. Élytres larges aux épaules, fortement impressionnés, puis assez diminués à l'extrémité, qui est obliquement échancrée, revêtus d'un épais duvet fin et couché. Antennes robustes, 1^er^, 3^e^, 5^e^ articles moins longs que le 4^e^. — ♂, ♀. — Long. 14—17 mill.; larg. aux épaules 6—8 mill.

2. Cortodera semilivida (Ann. Soc. ent. Fr., 1891, Bull., p. CXCIII), v. **obscurans.** — Cette espèce passe quelquefois d'une coloration d'un noir gris, moins les pattes antérieures et l'extrémité de l'abdomen, à une coloration d'un jaune rougeâtre, avec pubescence d'un gris jaune.

3. **Callimus akbesianus,** n. sp. — *Niger, parum elongatus ; antennis pedibusque nigris, capite nigro-cæruleo, elytris (sparse punctatis et in apice spinosis) viridi-cæruleis, prothorace abdominisque rufis.* — Long. 8 mill. — 1 exempl., coll. C. Delagrange.

4. Cerambyx Scopolii Füssl., v. **nitidus.** — Moins fortement granuleux et plus brillant que les exemplaires européens, prothorax à plis moins embrouillés que *C. Scopolii*, moins réguliers que *C. multiplicatus.*

5. Callidium ? æneum Deg. (dilatatum Payk.). — Variété à élytres finement granulés et ponctués, prothorax court, bien transversal, an-

tennes noirâtres, courtes. Pourra s'appeler **syriacum**. Variation à élytres paraissant un peu plus granulés aux épaules. — 1 ♀, coll. C. Delagrange.

6. **Phytœcia (Coptosia) trilinea,** n. sp. — *Lata, nigra, pilis nigris hirsuta. Prothorace crebre punctato, nigro, tribus lineis albidi-luteis ornato; elytris profunde punctatis tribus lineis albidis ornatis; sutura scutelloque (rotundato) paulum luteis; antennis pedibusque rufis, femoribus obscuris.* — Long. 9—10 mill. — Coll. C. Delagrange.

Le Secrétaire : J. Gazagnaire.

Bulletin bibliographique

Académie des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'), 1891, 1er sem., nos 15 et 16. ⊙

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), mars 1892. (·)

Academy of natural Sciences of Philadelphia (Proceedings), 1891, III. — J. E. Ives. Echinoderms and Crustaceans collected by the West Greenland Expedition of 1891.

Agricultural Gazette of N. S. Wales, III, 1 et 2, 1892. — D. W. Coquillet. History of the Hydrocyanic Acid Gas Treatment for Scale-Insects. — A. Sidney Olliff. Entomological Notes.

Apiculteur (L'), mars 1892. — Numéro supplémentaire.

Cincinnati Society of Natural History (Journal), XIV, 3 et 4, 1891-92. — Ch. Dury. Zoological Notes.

Entomological Society of London (Transactions), 1891. — G. T. Baker. Notes on the genitalia of a gynandromorphous *Eronia Hippia* (1 pl.). — T. A. Marshall, A Monograph of British Braconidæ, IV (1 pl.). — Lord Walsingham. African Micro-Lepidoptera (5 pl.). — Col. C. Swinhoe. New species of moths from Southern India (fig. et 1 pl.). — F. Merrifield. Conspicuous Effects on the markings and colouring of Lepidoptera caused by exposure of the pupæ to different temperature conditions (1 pl.). — R. Trimen. On some recent additions to the list of South African Butterflies. — H. H. Druce. A Monograph of the Lycænid genus *Hypochrysops,* with descriptions of new species. — G. T. Baker. Notes on the Lepidoptera collected in Madeira by the late T. Vernon Wollaston (1 pl.). — H. W. Bates.