

Soc. ent. Fr., 1891, Bull. CLXXVII). — Bien caractérisée par l'écusson garni de duvet cendré et les antennes, peut-être mieux qu'une variété ?.

88. PHYTOECIA (SEMIANGUSTA) DELAGRANGEI Pic (Descript. Long. Syrie, p. 2). — *Magna, tomento griseo-virescente dense vestita. Scutellum dense albo tomentosum. Thorax cylindricus, linea media albo tomentosa longitudinali punctoque denudato utrinque ornatus. Elytra thorace basi multo latiora, inde in apicem subattenuata. Pygidium rotundatum. Subtus griseo-tomentosa.* — Long. 14—16 mill.

Chez cette espèce, l'abdomen paraît avoir une forme particulière, le dernier arceau est marqué, chez le mâle, d'une grande fossette profonde sur la partie postérieure ; chez la femelle, cet arceau est marqué en avant d'un petit sillon, et, en arrière, d'une dépression plus ou moins accentuée. Le pygidium, assez long, est un peu poilu et bien impressionné en dessous, surtout chez le mâle ; le 3^e article des antennes est assez long, légèrement courbé. Chez cette espèce aussi, le duvet, ordinairement plus ou moins gris verdâtre, passe au jaunâtre plus ou moins prononcé.

J'ai pensé qu'il y avait lieu de diviser en deux groupes l'ancien sous-genre *Musaria* Th. :

L'un comprenant des Insectes à antennes épaisses et assez courtes, n'atteignant pas ordinairement la longueur du corps, à 3^e article court, les épaules et la forme générale larges. — S.-G. MUSARIA.

L'autre, ayant les antennes assez épaisses, mais plus longues, dépassant plus ou moins les élytres, au moins chez le mâle, avec le 3^e article paraissant plus long que dans la section précédente et la forme plus étroite, généralement bien allongée ; taille grande. — S.-G. **Semi-angusta.**

Le sous-genre *Semiangusta* s'éloigne, à première vue, des *Conizonia* (cette coupe caractérisée surtout par les antennes robustes et courtes) par les antennes moins épaisses et plus longues, des *Helladia* et *Coptosia* par le prothorax moins court et moins transversal, des *Phytæcia* proprement dits, par la taille avantageuse, le prothorax un peu moins cylindrique, etc. Il devra se placer entre le sous-genre *Musaria* et les *Phytæcia s. str.*

Resteront dans l'ancienne division des *Musaria* : *P. Argus, affinis, Boeberi* Gangl. et espèces affines.

A ranger dans le groupe nouveau : *P. Delagrangei* Pic, *Pici* Reitter, *adusta* Reitt., etc.

Chez les *Phytæcia*, dans les mêmes groupes, la longueur des articles