

*Phytaecia persathensis* ♂. Noir mat avec les pattes moins les tarsi, une tache sur le rebord huméral, la plus grande partie de l'abdomen testacé. Tête densément couverte de poils serrés grisâtres, hérissée ainsi que le prothorax de poils gris-jaunâtre assez longs. Tête à ponctuation forte, large, rapprochée. Prothorax à peu près aussi large que long, à ponctuation assez forte, moins rapprochée que celle de la tête, à peine arrondi sur les côtés, rebordé en avant et en arrière avec une dépression transversale postérieure bien nette. Ecusson large, en demi cercle, un peu pubescent de jaunâtre. Elytres assez atténués à l'extrémité, tronqués dans cette partie, avec les épaules saillantes à ponctuation forte, peu rapprochée, plus écartée en arrière, ornés de côtes très faiblement marquées. Antennes fortes, à peu près de la longueur du corps. Pattes testacées, avec les tarsi noirs. Pygidium tronqué, très poilu à l'extrémité.

Long. 13 mill. Persath.

Très voisin de *Volgensis* Kraatz. et *Bæberi* Ggl. moins pubescent en dessus que le premier, moins noir que la seconde espèce avec une sorte de bande médiane prothoracique pileuse, on pourrait la considérer comme une variété de *Ph. Bæberi* Ggl.

*Phytaecia nigratarsis* ♂. Noir, vaguement bleuâtre, brillant avec les pattes antérieures moins les tarsi, les cuisses intermédiaires et postérieures, les deux derniers anneaux de l'abdomen plus ou moins testacés-rougeâtres; quelques poils obscurs dressés sur le corps. Tête à ponctuation modérément forte, dense, plus profonde sur le front. Antennes minces, de la longueur du corps. Prothorax un peu plus long que large, à ponctuation modérément forte, dense, moins serrée sur le disque, à côtés presque parallèles avec une sorte de dépression latérale sur les côtés de la base. Ecusson en demi cercle, pubescent. Elytres bien atténués à l'extrémité, tronqués dans cette partie avec les épaules assez saillantes, la ponctuation modérément forte, peu rapprochée, rebordés sur la suture avec un rebord externe; une dépression longitudinale nette sur le milieu de chaque élytre. Pattes d'un testacé rougeâtre avec les tarsi et les quatre tibia postérieurs noirs. Pygidium légèrement caréné en dessous et tronqué-sinué à l'extrémité.

Long. 12 mill. Van.

Très voisin de *Ph. Pici* Reit. moins noire en dessus, extrémité de l'abdomen rougeâtre, pattes à coloration noire plus étendue.

Provenant des mêmes fructueuses récoltes je possède encore une belle *Leptura* ♀. (*Deyrollei* Pic in lit.) voisine de *varicornis* Dalm. ayant les premiers articles des antennes annelés de testacé à la base mais avec les élytres d'un jaunâtre brillant marqués chacun d'une tache presque arrondie avant le milieu et d'une tache oblongue très près de l'extrémité noires. Tête et prothorax à ponctuation fine, dense et poils clairs dressés; élytres larges, tronqués à l'extrémité, à ponctuation irrégulière, peu rapprochée. Pattes noires avec les quatre tibia antérieurs largement testacés au sommet. Dessous du corps à poils courts, jaunâtres. Tibias armés de deux épérons. Long. 15 mill. Trébizonde.