

https://www.biodiversitylibrary.org/

L'Echange : organe des Naturalistes de la région lyonnaise
Lyon, L. Jacquet, [1885-
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/52333

années 20-21 (1904-1905):
https://www.biodiversitylibrary.org/item/284961

Article/Chapter Title: Diagnose d'un « Clytus » du mont Taurus
Author(s): Pic M
Subject(s): Classification
Page(s): Page 65

Holding Institution: Natural History Museum Library, London
Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 11 November 2026 7:14 AM
https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1978507i00284961.pdf

This page intentionally left blank.

Vingtième année. N° 237. Septembre 1904.

L'Échange, Revue Linnéenne

Diagnose d'un « Clytus » du mont Taurus

Clytus gulekanus. — Allongé, subparallèle, noir à dessins jaunes, antennes et pattes testacées avec les cuisses en partie rembrunies ; prothorax subglobuleux, bordé antérieurement de jaune et maculé de même latéralement vers le milieu et à la base ; écusson jaune ; élytres présentant les dessins jaunes suivants : une courte fascie subhumérale oblique, une fascie médiane sinuée et remontant courtement sur la suture, une bande antéapicale et une bordure apicale étroite ; poitrine maculée et abdomen bordé de jaune. L. 18 m. (coll. Pic). — Fasciès de *Xylotrechus*, mais tête dépourvue de carènes et paraissant voisin de *Cl. signifer* Mars = *insignitus* Frm. (ex-description).

M. Pic.

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Sphinginopalpus Barkeri (1). — Hérissé de longs poils clairs, avant-corps subopaque, noir avec la base du prothorax testacé, élytres brillants, fortement ponctués, d'un noir verdâtre, un peu allongés chez ♂, en ampoule chez ♀, base des antennes et base de tous les fémurs, extrémité des 4 tibias antérieurs et leurs tarses testacés, le reste de ces membres foncé. Palpes moyens ; tête relativement grosse, creusée chez ♂ ; prothorax très long, rétréci et déprimé à la base ; élytres très fortement ponctués, rebordés sur les côtés, un peu déprimés et resserrés à la base, élargis et convexes ensuite ; pattes grêles avec les tibias postérieurs arqués et élargis. Long. 2-2,3 m. Natal : Malvern (C. N. Barker). Bien distinct de *Martini* Pic par les palpes, la forme moins robuste, la coloration des pattes.

Sphinginopalpus formicoides ♀. — Hérissé de longs poils clairs, subopaque avec les élytres faiblement brillants, noir, sauf le devant de la tête, la base du prothorax et le rebord basal des élytres qui sont roussâtres, antennes d'un roussâtre testacé rembrunies au sommet, pattes noires à l'exception des 4 tarses antérieurs, du sommet des tibias antérieurs et les tibias intermédiaires qui sont d'un testacé roussâtre. Palpes moyens ; tête pas plus large que le prothorax ; prothorax assez long, progressivement atténué en arrière, subdéprimé à la base ; élytres modérément ponctués, très convexes, à peine déprimés à la base avec les épaules effacées ; pattes antérieures grêles, postérieures robustes, les tibias très larges et arqués. Long. 3 m. Cape Colony : Grahamstown (O'neil). — Plus robuste que l'espèce suivante avec les élytres dépourvus de fascie, ce qui la rend facile à reconnaître.

Sphinginopalpus limbatus. — Modérément pubescent, un peu brillant, noir à reflets métalliques avec les élytres ornés de dessins blanchâtres (une fascie transversale près de la base et une bordure étroite, suturale et latérale, presque complète), antennes et

(1) Pour ne pas multiplier les divisions génériques, je range momentanément ces espèces avec les *Sphinginopalpus*, bien qu'elles présentent avec ceux-ci quelques petites différences.