

D. 7-lineatum v. n. rufoapicale. Forme oblongue allongée, élytres à revêtement noir avec bordure, bande humérale et dorsale jointes postérieurement grises, sommet roux. Salonique.

D. subobesum n. sp. Oblongo-subovalis, postice attenuatus, parum convexus, nitidus, niger, non dense sed uniformiter griseo-luteo pubescens ♀, sæpe fere glaber ♂ ; thorace medio parum distincte albo lineato, fortiter non dense punctato ; elytris latis, sat brevibus, lateraliter arcuatis, postice attenuatis, sat fortiter punctatis, externe carinatis, albo cinctis, linea humeralis grisea parum distincta aut oblitterata, membris nigris. L. 11-14 m. Amasia. Espèce à placer près de *pedestre* Poda, caractérisée par sa forme robuste et ses membres foncés.

D. sericatum v. n. subreductum. Oblongus, sat robustus, supra dense fulvo, pro parte indistincte nigro pubescens, elytris albo marginatis, linea humeralis integra ornatis, membris rufis. Asie M^{re}. — Caractérisé par son revêtement et les antennes plus claires.

Le **sericatum v. Perroudi**, de Crimée, a un revêtement général fauve en dessus avec quelques taches noires aux élytres ; ceux-ci ont, en plus d'une bordure et d'une bande humérale, une bande discale assez longue blanchâtre, le 1^{er} article des antennes et les pattes sont rousses.

D. solyzinosum n. sp. Oblongo-subovatus, sat convexus, niger, capite et thorace griseo et fulvo pubescentibus, fortiter punctatis, elytris nigro pubescentibus, externe luteis, in singulo late albo trilineatis : linea humeralis, linea interna elongata, postice attenuata, linea suturalis et prope suturam anguste et interrupte griseo vittatis, membris rufis. L. 11 m. Solyzino. — A placer près de *Lederi* Kr.