

te articulorum superiore nigra, inferiore cinereo flavescente. Thorax & caput nigra. Elytra fascia in medio alba lata, infra quam tubercula nodosa, in singulis, duo, quæ junguntur linea alba versus apicem elytrorum nonnihil procurrente.

Cerambyx bipunctatus. Stenocorus Scopoli. Caput, antennæ, elytra nigra. Thorax rubro - flavus punctis duobus nitentibus nigris. Pedes rubro - flavescentes, tarsis nigris. Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

Cerambyx rugosus. Stenocorus Scopoli. Niger, thorace subplano, nitente, fere orbiculari, submarginato. Elytris rugosis mollibus, sub medium coarctatis, versus apicem latioribus, ad basim cupreo viridibus, ad apicem cupreo rufescentibus. Long. 5. lin. Idem Styriam etiam superiorem incolit.

Leptura melanura, & varietates ejusdem, *sanguinolenta*, *detrita*, *arcuata*, *arietis*, *præusta*. Linn. *Dubia Scopoli*, *aquatica fasciata*. de Geer.

Leptura bilineata. Stenocorus Scop. Antennæ, thorax, pedesque nigra, scutellum album. Elytra nigra lineis curvis ad futuram versus basim elytrorum sursum coeuntibus; apice elytrorum albo. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Leptura rubens. Drionus ruber. Scop. Antennis, capite, thorace, elytris, pedibus, pectore, abdomineque con-

colo-