

Im Araxesthal bei Ordubad, von Frl. Antonie Kubischtek entdeckt.

31. *Rhagium mordax* Deg. var. nov. *caucasicum*. Von der Stammform abweichend durch hellere greise Behaarung und durch die mittlere, dunkle Rückenbinde auf den Flügeldecken, welche sich zwischen den gelben Querflecken befindet. Dieselbe ist breiter und an den Seiten niemals dunkler gefärbt, wodurch diese Form ein ganz anderes Aussehen bekommt. Die vordere, gelbe Binde ist meist auf einen schrägen Querfleck reducirt und die hintere fast zu zwei Makeln unterbrochen.

Im centralen Caucasus selten; häufiger im Araxesthale bei Ordubad.

32. *Tetropium gracilicorne* n. sp. Dem *Tetr. luridum* L. sehr ähnlich und nahe verwandt und in folgenden Punkten abweichend und sicher specifisch verschieden: Körperform länger, schmaler, paralleler, die Fühler nicht länger, aber immer deutlich dünner, die ersten 5 Glieder, mit Ausnahme des Wurzelgliedes an der Spitze nur sehr schwach, kaum bemerkbar knotig angeschwollen, der Halsschild ist an den Seiten weniger, aber viel gleichmäßiger gerundet, nach hinten nicht so stark eingezogen, der Vorderrand, namentlich beim ♀ in der Mitte ausgebuchtet, in der Mitte weniger weitläufig punktirt und daher weniger glänzend; die Flügeldecken sind länger und schmaler, wenig breiter als der Halsschild, nicht wie bei *luridum* $2\frac{1}{2}$ mal, sondern stets reichlich 3 mal so lang als zusammen breit, endlich sind die Schenkel des ♀, namentlich die hinteren viel weniger angeschwollen.

Wurde von Gräser bei Chabarowka in Ostsibirien zahlreich gesammelt. Das *Tetr. luridum* kommt daselbst ebenfalls vor, ist aber von der obigen Art leicht zu unterscheiden und wohl bisher mit demselben vermengt worden.

33. Mit *Cassida desertorum* Gebl. wurden bisher mehrere Arten vermengt, die ich in nachfolgender Weise auseinanderhalte:

A. Kopf schwarz, Körper klein, länglich oval *araxicola* n. sp.

B. Kopf, sowie der übrige Körper (mit Ausnahme der Augen) grün, im Alter grüngelb.

a. Fld. länger als zusammen breit, bis gegen die Mitte parallel, dann zur Spitze verengt. Halssch. glänzend, deutlich punktirt; Fld. dicht in Reihen, streifenartig punktirt.

Größere Art. Die großen Schulterhöcker, von oben gesehen, bis zum äußersten Rande der Fld. reichend.

Kirghisia, Astrachan, Turcmenien . . *desertorum* Gebl.