

- Schulterbeule schwarz; die Grundfarbe fleischroth. — Mongolei. — W. 1898, 126 . . . . . *amoenus* Reitt.
- 6' Fühler einfarbig schwarz behaart; Fld. stark und dicht, innen und an der Spitze allmählich feiner punktirt; schwarz, Halschild wenig breiter als lang, an den Seiten leicht gerundet, dicht und grob, etwas runzelig punktirt, mit angedeutetem Lateralhöcker, die Scheibe einzeln abstehend behaart, vor der Basis jederseits mit gehobener Beule; Schildchen dunkel; Fld. lebhaft blutroth, eine gemeinschaftliche lange, nach hinten verbreiterte Dorsalmakel, welche vorne spitzig und verkürzt, hinten meist die Spitze erreicht. Die Schulterbeule ist gewöhnlich schwarz, seltener nur gebräunt, oder einfarbig roth; sehr selten erreicht die schwarze Dorsalmakel die Basis am Schildchen und die Schultermakel ist verlängert und mit der Dorsalmakel verbunden, wodurch die Zeichnung des *A. halodendri* sich wiederholt (v. *maculibasis* m.). — Turkestan: Aulie-Ata. (Dr. O. Staudinger). *forticornis* n. sp.

Anmerkung: *Anoplistes minutus* Hamarström ist mir nicht einmal der Beschreibung nach bekannt.

38. *Bedelia viridicoerulea* n. sp.

*Subtus nigra, supra viridicoerulea, glabra, nitida, labro, ore, antennarum basi pedibusque testaceis; capite cum oculis thorace minus angustiore, antice dense, postice parce punctato, linea transversa frontali distincta, foveola intermedia oblonga impressa; antennis corpore dimidio superantibus, articulis oblongis; prothorace coleopteris valde angustiore, longitudine  $\frac{1}{3}$  latiore, parce distincte punctato, latitudine maxima ante medium, angulis posticis valde obtusis, basi profunde lineatim marginata; elytris thorace  $2\frac{1}{2}$  longioribus, subparallelis, apice conjunctim rotundatis, supra striatopunctatis, striis apicem versus obsoleteioribus, striola scutellari distincta, interstitiis fere planis, callo humerali producto, dorso pone basin ad latera parum depresso, femoribus obtuse unidentatis, tibiis posterioribus apice paullo incrassatis, extus ante apicem excisis; tarsorum articulo penultimo vix dilatato, valde lobato, unguiculis intus leviter unidentatis.* — Long. 2,8—3,5 mill.

Durch die Färbung schon von *B. angustata* Lef. abweichend. Durch dieselbe der *Nodostoma fulvipes* Motsch. aus Ostsibirien und Japan, die ich nicht kenne, ähnlich, aber von dieser schon durch die schmälere Gestalt abweichend.

Buchara: Kulab. (Dr. O. Staudinger und A. Bang-Haas.)