

mêmes régions, mais d'une coloration très différente qui rappelle celle de *G. laevistriatus*, du Japon. Les saillies juxta-oculaires sont peu marquées.

8. *G. (ANOPLYTES) SEMICUPREUS* Reitt. = *G. corinthius* Fairm.

— *Descriptions de deux Coléoptères subeuropéens*, par E. Abeille de Perrin (de Marseille) :

1. *Saperda (COMPSIDIA) ocellata*, n. sp. — Long. 15 mill. — ♀. A peu près de même taille et de même aspect que *S. quercus*. Couleur d'un gris ardoisé, forme massive. Tête fortement ponctuée, à duvet d'un gris jaune ; antennes minces et dépassant le milieu des élytres, noires par dessus, à duvet grisâtre uniforme par dessous, où elles sont, en outre, sétosellées ; vertex paré de quatre lignes longitudinales de duvet jaune, les deux externes plus fournies. Corselet transverse, légèrement étranglé à la base, à points forts, serrés, subrugueux, portant deux fortes lignes entières et longitudinales de duvet jaune, continuant les deux lignes externes du vertex, ayant en outre une très légère ligne médiane du même duvet. Écusson noir, à duvet gris, partagé dans son milieu par une fine ligne duveteuse jaune, qui continue celle du corselet. Élytres peu convexes, allongés, acuminés à l'apex, où ils deviennent pointus séparément, à points forts et transversalement rugueux, couverts de duvet gris et frangés sur les bords de cils noirs ; portant chacun trois grosses taches de duvet jaune, ovoïdes, un peu allongées et comme cerclées de noir : la première au tiers antérieur, placée plus près du rebord que de la suture ; les deux autres également distantes, placées l'une sous l'autre, au milieu de la largeur de l'élytre ; ornés, en outre, de gouttelettes de même couleur, au nombre d'une dizaine, irrégulières et asymétriques, serrées çà et là. Dessous du corps à duvet gris, devenant jaune sur les côtés de la poitrine ; points enfoncés dépourvus de duvet, petits et serrés sur les pattes, médiocres et très serrés sur la poitrine, gros et très espacés sur le ventre ; les côtés de celui-ci sont, en outre, marqués d'une série d'énormes points dénudés, placés chacun vers la base de chaque anneau ventral. Dernier segment tronqué-arrondi.

Un seul exemplaire, de ma collection, provenant d'Akbès (Haute-Syrie), où il a été capturé par M. C. Delagrangé.

Grâce à l'obligeance extrême de M. L. von Heyden, qui m'a communiqué son type de *S. quercus*, j'ai pu lui comparer mon espèce, qui en est très voisine, mais qui, à mon avis et au sien, doit en être séparée par

les caractères suivants : 1° sa forme est plus large, le corselet notamment est nettement transversal au lieu d'être au moins aussi long que large ; 2° les antennes, légèrement plus minces, sont uniformément noires par dessus, grises par dessous, au lieu d'avoir leurs articles annelés ; 3° les taches duvetueuses sont très grosses, très jaunes et subocellées ; 4° les élytres sont mouchetés, en outre, de petites macules de même couleur ; 5° leur ponctuation est plus faible et plus espacée ; 6° les tibias sont plus minces ; 7° enfin les points dénudés du ventre sont beaucoup plus gros, très espacés, irréguliers et inégaux.

2. **Anthaxia Demaisonii**, n. sp. — Long. presque 5 mill. — Déprimé, brillant, entièrement couvert d'une villosité d'un châtain foncé, courte, oblique, couchée en arrière sur les élytres, couchée en avant sur le corselet, plus longue et dressée sur la tête. Celle-ci cuivreuse, avec quelques reflets irisés, densément et ruguleusement réticulée. Corselet d'un cuivreux verdâtre, transversal, côtés arqués simplement en avant, subéchancrés après le milieu, et se redressant à peine à la base, où les angles sont ouverts et émoussés ; une fossette longitudinale au milieu de la base ; surface couverte d'une réticulation lâche et transverse, légèrement en gerbe au milieu, obliquement verticale sur les côtés, qui sont un peu explanés vers les angles postérieurs. Écusson vert, guilloché, brillant. Élytres cuivreux, subdéprimés jusqu'après les deux tiers, faiblement acuminés de là au sommet, où ils sont arrondis séparément, sans denticulations à l'apex, calus huméral peu saillant et rugueux ; surface couverte de fortes rugosités, peu serrées, marge externe à points plus gros, mais confus près du sommet. Dessous du corps d'un doré verdâtre, brillant, à réticulation lâche ; prosternum large, plan, nettement rebordé, à mailles ombiliquées très grosses et lâches ; dernier segment à peine acuminé et à bords très légèrement retroussés. Tibias postérieurs droits.

Un seul sujet ♂ de Perse m'a été communiqué par M. Ch. Demaison, à qui je dédie l'espèce.

Il est voisin d'*A. canifrons* et d'*A. Heydeni*, qui ont la pubescence du front blanche ou grise, et d'*A. semiusta*, qui a une coloration particulière et, en outre, sur le corselet, une sculpture fine et serrée, surtout sur les macules noires.

— *Observations sur les Frelons*, par Charles Janet (de Beauvais) :

Les enveloppes, formées d'un simple feuillet, que les Frelons construisent successivement autour de leur nid, sont de plus en plus grandes.