

Taille : longueur : 30 mm. ; largeur : 10 mm.

Origines : *splendens* mâle ; *hispanus* femelle ; élevages de 1939.

De plus amples renseignements seront donnés dans « Hybrides d'élevage ».

Il y a lieu d'indiquer cependant que ce Carabe est magnifique et qu'il est l'un des plus beaux bijoux d'une collection. Il rivalise largement avec *Cræsus*. Il ne serait en outre pas impossible qu'il ait été déjà trouvé, soit aux confins de la Grésigne, soit à ceux de la Montagne Noire, où cohabitent *splendens* et *hispanus*.

Je dédie ce beau Carabe à mon collègue et ami M. OLIER en reconnaissance de son excellente amitié et de ses très vifs encouragements.

Nouveaux Cérambycides paléarctiques

(1^{re} note)

par Étienne DE BREUNING.

1. *Dorcadion longulum*, nova.

♂ très allongé. Les antennes dépassant le milieu des élytres ; les deux premiers articles très densément pourvus de courts poils érigés. Le front assez densément et très finement ponctué ; le reste de la tête un peu plus densément et assez grossièrement ponctué. Le pronotum deux fois plus large que long, trilobé à la base, densément et plutôt grossièrement ponctué, les points en partie confluent ; l'épine latérale large, conique, pointue ; l'écusson très étroit. Les élytres très allongés, fortement convexes, légèrement arrondis latéralement, pas plus larges que le pronotum à leur base (les épaules très peu développées), densément et grossièrement ponctués, les points de plus en plus fins vers le bout. Toute la surface pourvue de poils érigés noirs extrêmement courts.

Noir luisant ; le scape, les cuisses et les tibias rouge foncé ; couvert d'une pubescence brun grisâtre (cette pubescence peu dense à la surface). Sur les élytres, une très étroite bande suturale jaune pâle.

♀ inconnue.

Longueur : 14 mm. Largeur : 4 mm. 2/3.

Type : un ♂ d'Anatolie : Bos Dagh, dans ma collection.

2. *Dorcadion albicolle*, nova.

♂ proche d'*analolicum*, Pic, mais le pronotum très finement ponctué, sans bande longitudinale médiane déprimée ; l'épine latérale pointue.

Le pronotum en majeure partie couvert de pubescence blanche, entremêlée seulement d'un peu de brun rougeâtre ; la bande humérale blanche des élytres plus large ; la dorsale n'atteignant pas la ligne médiane, mais continuée par quelques très petites taches blanches ; le scape et les jambes rouge clair.

♀ inconnue.

Longueur : 10 mm. Largeur : 3 mm. 1/2.

Type : un ♂ d'Anatolie : Konia, dans ma collection.

3. *Dorcadion convexum*, nova.

♂ de stature ovalaire. Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres; les deux premiers articles sans poils érigés. Le front densément et très finement ponctué; l'occiput un peu plus grossièrement ponctué; les joues très densément ponctuées-ridées. Le pronotum transverse, convexe, très densément et assez grossièrement ponctué, les points confluant en partie transversalement; au milieu, une bande longitudinale déprimée distincte; l'épine latérale courte, étroite, très pointue; l'écusson triangulaire, arrondi au bout. Les élytres allongés, très convexes, fortement arrondis latéralement, très densément et assez finement ponctués, les points plus gros aux épaules, plus fins vers le bout. Une crête humérale légèrement indiquée.

Noir; les jambes et les antennes rouge clair; entièrement couvert d'une pubescence brun foncé (cette pubescence éparse à la surface); les élytres ornés d'une très étroite bande suturale blanche.

♀ inconnue.

→ Type : un ♂ d'Anatolie : Achu Dagh, dans ma collection.

4. *Dorcadion pseudocinctellum*, nova.

♂ proche de *cinctellum*, Fairm., mais le scape plus densément pourvu de poils érigés; le deuxième article des antennes élargi au bout du côté inférieur (presque comme chez *Bodemeyeri*, Dan.); l'épine latérale du pronotum large, conique-émoussée; son disque moins densément ponctué; la bande longitudinale médiane déprimée est seulement légèrement indiquée; les épaules un peu plus proéminentes.

La pubescence du fond de la surface plus claire, brun jaunâtre.

♀ montrant les différences normales; la pubescence est identique.

Longueur : 9 à 12 mm. Largeur : 3 à 5 mm.

Type : un ♂ d'Anatolie : Ak-Chéir, dans ma collection.

5. *Dorcadion pilosipenne*, nova.

♂ proche de *scabricolle*, Dalm., mais le front finement ponctué, l'occiput et le pronotum beaucoup plus densément et moins grossièrement ponctués; le pronotum pourvu d'une bande longitudinale médiane légèrement déprimée; l'épine latérale plus pointue, un peu recourbée; entièrement pourvu de plus longs poils érigés.

La pubescence est comme chez *scabricolle* forme typique, mais la bande humérale blanche est plus large; la tête et le pronotum couverts d'une pubescence plus dense; de chaque côté du vertex, une grande tache brun noirâtre; de chaque côté du milieu du pronotum, une large bande longitudinale pareille; au milieu du pronotum, une bande longitudinale blanche est indiquée.

♀ plus large que la ♀ de *scabricolle*; les élytres plus arrondis latéralement; la crête humérale très proéminente.

Longueur : 12 à 14 mm. Largeur : 4 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Type : un ♂ de l'île Mytilène, dans ma collection.

6. *Dorcadion pilosum*, nova.

♀ de stature en ovale allongé. Les antennes ne dépassant pas le milieu des élytres ; les deux premiers articles pourvus de poils érigés. La tête peu densément et très finement ponctuée. Le pronotum plus de deux fois plus large que long, très densément et finement ponctué, pourvu d'une bande longitudinale médiane légèrement déprimée ; l'épine latérale courte, large, conique. Les élytres allongés, médiocrement convexes, peu densément et très finement ponctués, pourvus d'une crête humérale et d'une crête dorsale émoussées peu distinctes. Entièrement couvert de courts poils érigés noirs.

Noir ; le scape et les jambes rouges ; les joues, les bords des yeux, la partie latérale du pronotum, le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre ; de chaque côté du milieu du vertex, une grande tache triangulaire brun rougeâtre foncé. Le pronotum couvert d'une pubescence brun rougeâtre et pourvu d'une étroite bande longitudinale médiane gris blanchâtre ; l'écusson blanc. Les élytres couverts d'une pubescence brun foncé ; sur chaque élytre, une très étroite bande latérale blanche à bord intérieur inégal. Les épipleures également blancs ; une étroite bande humérale blanche, qui dépasse sur toute sa longueur la crête humérale vers la partie latérale déclive ; une bande dorsale pareille, qui se réunit vers le bout avec la bande humérale et qui s'élargit avant le milieu de telle manière qu'elle s'y réunit presque avec l'humérale et y atteint aussi presque la suturale, et une étroite bande suturale blanche. Les antennes couvertes de pubescence brun assez foncé.

♂ inconnu.

Longueur : 11 mm. Largeur : 4 mm. 1/2.

Type : une ♀ de l'île Mytilène, dans ma collection.

7. *Dorcadion pseudarcivagum*, nova.

♂ très proche d'*arcivagum*, Thoms., mais un peu plus petit ; les parties latérales du pronotum plus grossièrement ponctuées ; les élytres moins arrondis latéralement ; l'épine latérale du pronotum moins pointue.

Entre la bande dorsale et la suturale se trouve encore une macule basilaire blanche.

♀ montrant les différences normales ; l'épine latérale du pronotum un peu plus courte ; les élytres beaucoup plus arrondis latéralement.

Longueur : 9 à 11 mm. Largeur : 3 mm. 1/2 à 4 mm. 1/4.

Type : un ♂ d'Anatolie : Amasia, dans ma collection.

8. *Dorcadion rufoapicale*, nova.

♂ proche d'*hæmorrhoidale*, Hampe, dont *sanguinolentum*, Thoms. diffère spécifiquement, mais ce dernier nom étant préoccupé dans le genre par Scopoli, je le change en *apicerufum*, nomen novum ; mais la tête ponctuée plus éparsément ; le pronotum très éparsément et très grossièrement ponctué et pourvu d'une bande longitudinale médiane profondément déprimée ; le bord huméral finement denté.

Le dixième apical seulement de la longueur des antennes est rouge. Les épipleures couverts d'une dense pubescence blanche ; la bande suturale blanche est plus étroite.

♀ montrant les différences normales.

Longueur : 10 à 11 mm. Largeur : 3 mm. 1/3 à 3 mm. 1/2.

Type : un ♂ d'Arménie : Baibourt, dans ma collection.

9. *Dorcadion nachyceanicum*, *nova*.

♂ de stature en ovale allongé. Les antennes atteignant le commencement du tiers apical ; les deux premiers articles à peine pourvus de poils érigés. Le front densément et finement ponctué ; le reste de la tête très densément et assez grossièrement ponctué ; le vertex pourvu d'une profonde dépression longitudinale médiane. Le pronotum transverse, très densément et grossièrement ponctué et ridé ; l'épine latérale très courte, large, conique ; l'écusson triangulaire, arrondi au bout. Les élytres allongés, convexes, arrondis latéralement, largement arrondis au bout, assez densément et finement ponctués sur la moitié antérieure (les points indistincts sous la pubescence) ; une crête humérale à peine indiquée.

Noir ; les jambes et les antennes rouges ; les joues, les parties latérales du pronotum, le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence blanchâtre ; la tête et la surface du pronotum presque dénudées ; l'écusson blanc. Les élytres couverts de pubescence noir velouté ; sur chaque élytre, une étroite bande suturale blanche ; une autre humérale un peu plus large, interrompue par quelques taches foncées avant le milieu, et une étroite bande dorsale blanche qui ne commence qu'un peu après le milieu et se réunit vers le bout avec l'humérale ; les épipleures également blancs ; au bord latéral de la bande humérale se trouvent une bande gris noirâtre et une autre pareille à son bord intérieur (elle ne commence cependant qu'un peu après la base). Les derniers articles des antennes couverts de pubescence brun rougeâtre.

♀ inconnue.

Longueur : 10 mm. Largeur : 4 mm.

Type : un ♂ d'Arménie : province de Nachycean, Mont Soitch. 3.000 m., dans ma collection.

10. *Dorcadion griseipenne*, *nova*.

♀ proche de *bistriatum*, Pic, mais la tête finement ponctué ; le pronotum un peu moins grossièrement ponctué ; les élytres ponctués beaucoup plus distinctement dans la moitié antérieure.

Les jambes et les antennes rouge plus foncé. De chaque côté du vertex, une grande tache brun foncé. La bande grise dorso-humérale s'approche tellement de la bande suturale qu'il ne reste entre les deux bandes qu'une étroite bande longitudinale brun rougeâtre foncé ; la bande latérale grise est plus étroite ; la bande brun foncé entre celle-ci et la bande humérale est donc plus large ; au milieu de l'extrême base de chaque élytre, une petite tache brun rougeâtre foncé.

♂ inconnu.

Longueur : 11 mm. Largeur : 4 mm. 1/3.

Type : une ♀ d'Arménie russe : Semenowka, dans ma collection.

11. *Dorcadion glabricolle*, *nova*.

♀ allongée. Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres. Le front

densément et très finement ponctué ; le vertex un peu plus grossièrement et assez densément ponctué ; les joues très densément et rugueusement ponctuées ; une profonde dépression longitudinale au milieu du vertex et du pronotum. Le pronotum deux fois plus large que long, presque glabre et lisse vers le milieu ; les parties latérales et les côtés du disque (le long du bord antérieur et du bord postérieur, jusque vers la ligne médiane) très densément et assez grossièrement ponctués, les points confluant par places en formant des rides ; l'épine latérale assez longue, conique, un peu recourbée ; l'écusson triangulaire, arrondi au bout. Les élytres allongés, convexes, arrondis latéralement, seulement pourvus de quelques fines rides dans la région des épaules, et d'une dépression longitudinale le long de la crête humérale, qui devient ainsi proéminente ; la suture également déprimée.

Noir, luisant ; le scape et les jambes rouges ; les articles 2 à 4 des tarsi brun plus foncé ; le dessous couvert d'une petite pubescence brune, les jambes d'une pubescence jaunâtre ; la surface sans pubescence (peut-être accidentellement). Sur les élytres, une étroite bande suturale blanche et les épipleures blancs ; l'espace des épipleures, un peu au delà de la crête humérale, couvert d'une pubescence brun rougeâtre foncé ; dans la dépression longitudinale au bord intérieur de la crête, une fine pubescence blanche est indiquée.

♂ inconnu.

Longueur : 14 mm. Largeur : 5 mm. 1/3.

Type : une ♀ d'Anatolie, dans ma collection (leg. KINDERMANN).

12. *Dorcadion elbursense*, nova.

♂ de stature en ovale allongé. Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres ; les deux premiers articles sans poils érigés. La tête peu densément et extrêmement finement ponctuée. Le pronotum transverse, peu densément et assez grossièrement ponctué sur la partie médiane du disque, très densément et plus grossièrement sur les côtés, où les points confluent en partie ; au milieu, une profonde fossette prébasilaire allongée ; l'épine latérale courte, large, conique, pointue ; l'écusson triangulaire. Les élytres allongés, convexes, légèrement arrondis latéralement, largement tronqués-arrondis au bout, déprimés à côté de la suture dans le sens longitudinal, densément et peu finement ponctués, finement vers la suture, grossièrement vers le bord latéral, pourvus de quelques très gros points après les épaules ; une crête humérale est indiquée à la partie basilaire.

Noir ; le scape et les jambes rouge foncé. Sur chaque élytre, une étroite bande suturale blanche et une autre noir velouté à côté d'elle. Le dessous et les jambes couverts d'une très fine pubescence gris jaunâtre, les antennes d'une pubescence brun rougeâtre foncé plus dense.

♀ montrant les différences normales ; la partie médiane du disque du pronotum très finement ponctuée ; les élytres éparsément et beaucoup moins grossièrement ponctués, les points indistincts vers la suture et à la moitié apicale.

Longueur : 11 à 13 mm. Largeur : 4 à 5 mm.

Type : un ♂ de Perse : monts Elbourz, dans ma collection.

13. *Dorcadion persianum*, nova.

♂ allongé. Les antennes beaucoup moins longues que le corps. La tête et le pronotum assez densément et très finement ponctués ; la tête pourvue d'un profond sillon longitudinal médian ; l'épine latérale courte, conique, pointue ; l'écusson triangulaire, arrondi au bout. Les élytres allongés, très convexes, densément et très finement ponctués, pourvus d'une crête humérale proéminente mais émoussée, bordée intérieurement par une dépression longitudinale.

Noir ; les jambes et les antennes rouges ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre (très éparsée sur le pronotum). Chaque élytre pourvu d'une étroite bande suturale blanche et d'une latérale, et d'une bande humérale plus large.

♀ inconnue.

Longueur : 14 mm. Largeur : 5 mm.

Type : un ♂ de Perse, dans ma collection.

14. *Dorcadion pseudinfernale*, nova.

♂ proche d'*infernale*, Muls. & Rey, mais de stature plus large ; le vertex, le pronotum et les élytres très finement ponctués ; le tubercule latéral du pronotum encore plus émoussé ; les jambes plus fortes ; les cuisses plus fortement en massue.

Entièrement noir sans pubescence.

♀ montrant les différences normales.

Longueur : 14 mm. 1/2 à 15 mm. 1/2. Largeur : 4 mm. 2/3 à 5 mm.

Type : un ♂ de Syrie : monts Amanus, dans ma collection.

15. *Dorcadion amanense*, nova.

♀ de stature en ovale allongé. Les antennes atteignant le milieu des élytres ; les deux premiers articles pourvus de poils érigés. La tête éparsément et très finement ponctuée et entremêlée de plus gros points ; le vertex pourvu d'un profond sillon médian. Le pronotum deux fois plus large que long, assez densément et finement ponctué, les points des côtés plus gros et confluant en formant des rides ; au milieu, une étroite bande longitudinale lisse ; l'épine latérale grande, conique, émoussée ; l'écusson étroit. Les élytres allongés, arrondis aux côtés, convexes, largement arrondis au bout, éparsément et très finement ponctués, les points effacés vers le bout ; une crête humérale à peine indiquée.

Noir ; les jambes rouge foncé ; couvert d'une pubescence brun foncé ; une très étroite bande longitudinale blanche au milieu de la tête et du pronotum ; les yeux bordés de blanc. Sur chaque élytre, une étroite bande suturale blanche ; une autre dorsale jaune blanchâtre, qui finit au commencement du quart apical ; une bande humérale et une bande latérale blanche un peu plus larges. Le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence jaune grisâtre.

♂ inconnu.

Longueur : 15 mm. Largeur : 5 mm.

Type : une ♀ de Syrie : monts Amanus, dans la collection BARR.

16. *Dorcadion syriense*, nova.

♀ de stature en ovale allongé. Les antennes n'atteignant pas le milieu

des élytres ; le vertex et le pronotum pourvus d'une dépression longitudinale médiane peu profonde ; le front assez densément ponctué ; les joues et l'occiput très densément, irrégulièrement et en partie grossièrement ponctués. Le pronotum deux fois plus large que long, peu densément et finement ponctué, de plus en plus densément et grossièrement vers les côtés, pourvu d'un assez long et large tubercule latéral conique obtus ; l'écusson triangulaire, petit. Les élytres allongés, médiocrement convexes, légèrement arrondis latéralement, largement arrondis au bout, assez densément et finement ponctués, les points très fins dans la moitié apicale ; rapeux à la base, surtout au bord intérieur du calus huméral et en dessous de l'épaule ; la crête humérale distincte, l'espace à son bord intérieur légèrement déprimé au quart basilaire.

Noir, luisant ; les premiers articles des antennes et les jambes rouges. Les élytres pourvus d'une étroite bande suturale blanche. Le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence jaunâtre ; les derniers articles des antennes, d'une pubescence brun rougeâtre.

♂ inconnu.

Longueur : 11 mm. Largeur : 4 mm.

Type : une ♀ de Syrie, dans ma collection.

17. *Dorcadion Chan-Tengrii*, nova.

♂ proche de *Dokhtouroffi*, Gnnglb., mais plus grand. Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres ; leur troisième article un peu moins long que le scape ; le vertex et le pronotum plus éparsement et très finement ponctués. Le pronotum pourvu d'une large dépression longitudinale médiane et d'une courte épine latérale conique émoussée. Les élytres ponctués beaucoup plus finement.

La pubescence de la surface brun rougeâtre, plus claire ; de chaque côté, au bord intérieur de l'épine latérale du pronotum, la pubescence devient blanchâtre. Sur chaque élytre, une large bande humérale blanche et une latérale qui est dentelée au bord intérieur.

♀ montrant les différences normales ; les antennes n'atteignant pas le milieu des élytres ; la crête humérale très proéminente ; la pubescence comme chez le ♂.

Longueur : 18 à 21 mm. Largeur : 6 mm. 1/3 à 7 mm. 1/3.

Type : un ♂ de Dzoungarie : mont Chan-Tengri, dans ma collection.

18. *Dorcadion chrysochroum*, nova.

♂ allongé. Les antennes dépassant à peine le milieu des élytres ; les deux premiers articles pourvus de courts poils érigés ; la tête densément et très finement ponctué. Le pronotum transverse, trilobé à la base ; très densément et finement ponctué et pourvu de quelques plus gros points dans la moitié basilaire, non ponctué le long d'une étroite bande longitudinale médiane ; le tubercule latéral court, large, émoussé ; l'écusson triangulaire. Les élytres allongés, très convexes, légèrement arrondis latéralement, tronqués-arrondis au bout, densément et très finement ponctués, plus éparsement et plus finement encore dans la moitié apicale ; sur chaque élytre, deux larges crêtes longitudinales discales émoussées légèrement élevées et

une crête humérale très légèrement indiquée à la partie basilaire.

Noir; le scape, les cuisses, les tibias et une partie des tarsi et de l'abdomen sont rougeâtres; les joues, les parties latérales du pronotum, le dessous et les jambes couverts de pubescence gris jaunâtre; le reste de la surface de pubescence dorée à léger lustre soyeux; une très étroite bande longitudinale médiane blanchâtre au milieu de la tête et du pronotum; de chaque côté du disque du pronotum, une bande longitudinale grise vague. Sur chaque élytre, une très étroite bande suturale blanchâtre, une étroite bande latérale gris clair et deux lignes longitudinales gris clair qui partagent la pubescence (entre la bande suturale et la latérale) en trois parties égales situées sur la crête humérale et sur les deux crêtes discales.

♀ montrant les différences normales.

Longueur : 15 à 16 mm. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 mm. 1/4.

Type : un ♂ de Grèce : mont Taygète, dans ma collection.

19. *Dorcadion veluchianum*, nova.

♂ proche de *lugubre*, Kr., mais de stature plus cylindrique. Le scape pourvu d'une cicatrice ouverte; la tête et le pronotum plus larges; les tubercules antennifères légèrement élevés; les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus petits, moitié moins longs que les joues; la tête et le pronotum moins densément ponctués et entremêlés de plus gros points. Le pronotum sans bande longitudinale médiane lisse; son bord antérieur et son bord postérieur plus distinctement bordés; son disque pourvu de trois bosses très légèrement élevées (une postmédiane au milieu et une prémédiane de chaque côté); l'écusson plus de deux fois plus large que long. Les élytres pas plus larges que le pronotum, largement arrondis au bout, sans crête humérale, grossièrement ponctués-ridés aux épaules et après les épaules et granulé aux épaules; les épaules plus proéminentes; la surface sans poils érigés.

Noir mat; les segments abdominaux frangés de brun jaunâtre à leur bord postérieur; la partie dorsale des tibias et le dessous des tarsi frangés de brun jaunâtre.

♀ inconnue.

Longueur : 14 à 16 mm. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 mm.

Type : un ♂ de Grèce : Veluchi, dans ma collection.

20. *Dorcadion pseudolugubre*, nova.

♂ très proche de *lugubre*, Kr., mais plus étroit et plus allongé; le pronotum pourvu d'une légère dépression longitudinale médiane dans sa moitié antérieure; les élytres plus arrondis; la crête humérale moins proéminente, arrondie; la partie au bord intérieur de cette crête plus grossièrement ponctuée et ridée; une seule crête dorsale, qui n'est que très légèrement indiquée; la surface couverte de courts poils érigés noirs.

♀ montrant les différences normales; les épaules normalement développées; la crête humérale plus développée, mais beaucoup moins proéminente que chez la ♀ de *lugubre*; la crête dorsale non indiquée.

Longueur : 14 à 15 mm. Largeur : 5 mm. à 5 mm. 1/3.

Type : un ♂ de Macédoine : Karatschköi, dans ma collection.

21. *Dorcadion Heyrovskyi, nova.*

♂ proche de *ljubetense*, Pic, mais le disque du pronotum distinctement plus finement ponctué, couvert, comme la tête, d'une dense pubescence gris blanchâtre ; de chaque côté du vertex, une tache triangulaire brun noirâtre et une large bande longitudinale de même couleur de chaque côté du milieu du pronotum. La bande basilaire noire entre la bande suturale et la bande dorsale des élytres est plus longue, atteignant ou dépassant la fin du tiers basilaire, parfois réunie ou presque réunie avec une tache correspondante préapicale ; les taches noires entre la bande dorsale et la bande humérale également le plus souvent plus grandes.

♀ montrant les différences normales.

Type : un ♂ de Yougoslavie : Kozuf Planina, dans la collection HEYROVSKY.

22. *Dorcadion glabriscapus, nova.*

♂ de stature en ovale allongé. Les antennes dépassant distinctement le milieu des élytres ; les premiers articles des antennes sans poils érigés. Le front densément et très finement ponctué ; le reste de la tête très densément et finement ponctué. Le pronotum transverse, très densément, irrégulièrement et grossièrement ou très grossièrement ponctué, les points confluant surtout sur les côtés ; pourvu d'une étroite bande longitudinale médiane déprimée ; l'épine latérale conique, pointue ; l'écusson large, triangulaire. Les élytres allongés, médiocrement convexes, largement arrondis au bout, légèrement arrondis latéralement, densément et très finement ponctués, pourvus d'une crête humérale émoussée mais distincte.

Noir ; entièrement couvert d'une fine pubescence blanche, mais cette pubescence très éparse sur le front, le vertex et le disque du pronotum. Les antennes couvertes, à partir du second article, de pubescence brun noirâtre.

♀ montrant les différences normales ; la crête humérale un peu plus proéminente.

Longueur : 11 mm. 1/2 à 14 mm. 1/2. Largeur : 4 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Type : un ♂ d'Albanie : Mal-i-That, dans ma collection.

23. *Dorcadion basigranosum, nova.*

♀ de stature en ovale allongé. Les antennes n'atteignant pas le milieu des élytres ; le troisième et le quatrième article réunis à peine plus longs que le scape. Le front très densément et finement ponctué et ridé, le reste de la tête et le pronotum extrêmement densément et finement ponctués et ridés. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une épine latérale conique émoussée ; l'écusson deux fois plus large que long, arrondi au bout. Les élytres allongés, arrondis latéralement, fortement convexes, largement arrondis au bout, densément et très distinctement granulés aux épaules ; le reste de leur surface finement chagriné et peu densément et extrêmement finement ponctué jusque vers le milieu.

Noir ; la tête et le pronotum pourvus d'une pubescence jaune grisâtre éparse ; l'écusson (sauf une bande longitudinale dénudée) et les élytres, d'une dense pubescence gris jaunâtre clair. Le dessous, les jambes et les antennes, d'une fine pubescence brun grisâtre.

♂ inconnu.

Longueur : 14 mm. 1/2. Largeur : 5 mm. 1/2.

Type d'Espagne : Alicante, dans ma collection.

24. *Dorcadion evorense*, nova.

♀ très proche de *mucidum*, Dalm., mais les antennes plus courtes, n'atteignant pas la fin du tiers basilaire des élytres; l'épine latérale du pronotum étroite, pointue. Les élytres plus larges à la base, à peine élargis vers le milieu.

Noir, couvert d'une pubescence brune. Les élytres parsemés de taches brun foncé rangées en séries longitudinales : une à côté du bord latéral, une à côté de la suture et trois sur le disque. Les articles des antennes (à partir du troisième) annelés de jaunâtre à la base.

♂ inconnu.

Longueur : 18 mm. Largeur : 6 mm. 1/3.

Type : une ♀ du Portugal : Evora, dans ma collection.

25. *Dorcadion impunctatum*, nova.

♂ proche de *Lorquini*, Fairm., mais plus petit. Les antennes plus fines ; leur troisième article distinctement plus long que le quatrième. La tête et le pronotum encore plus finement ponctués. Les joues densément et finement ponctuées ; les parties latérales du pronotum très finement ponctuées ; l'épine latérale du pronotum conique, émoussée. Les élytres pourvus de quelques points fins près des épaules.

Noir, luisant, sans pubescence.

♀ montrant les différences normales.

Longueur : 10 à 12 mm. Largeur : 4 mm. à 4 mm. 1/2.

Type : un ♂ d'Espagne : province de Teruel (Santa Eulalia), dans ma collection.

26. *Neodorcadion rubrosuturale*, nova.

♂ proche de *carinatum*, F., mais le disque du pronotum plus grossièrement ridé, sans bande longitudinale médiane lisse ; l'épine latérale plus longue, plus étroite dès sa base ; l'écusson encore plus large, près de trois fois plus large que long. Les élytres très densément et finement ridés et ponctués, les rides rangées en formant des lignes longitudinales un peu élevées ; la crête humérale beaucoup moins proéminente ; l'espace basilaire à son bord intérieur peu déprimé.

Rouge foncé ; la lèvre supérieure, les mandibules, l'extrême bord antérieur du pronotum, la suture, la partie apicale, la partie suturale, ainsi que les épipleures des élytres et que les jambes, sont rouge clair, couverts d'une fine pubescence éparse blanche ; de chaque côté du milieu du pronotum, avant le milieu, une tache blanche allongée de pubescence plus dense et une étroite bande longitudinale de même couleur au bord intérieur de l'épine latérale (elle n'atteint pas le bord antérieur) ; les côtés de l'écusson couverts d'une dense pubescence blanche. Sur chaque élytre, une étroite bande longitudinale blanche au bord intérieur de la crête humérale, une large bande longitudinale jaune à côté de la suture (qui reste dénudée), et cinq lignes longitudinales au bord extérieur de cette bande, de sorte qu'il reste, entre la cinquième de ces lignes et la bande humérale, un espace aussi large qu'entre

la bande humérale et le bord latéral : ces deux espaces couverts d'une pubescence très éparse. Les antennes presque sans pubescence ; les articles annelés de blanchâtre à la base.

♀ inconnue.

Longueur : 13 à 14 mm. Largeur : 5 à 6 mm.

Type : un ♂ de Mongolie : Inn-Chan, dans la collection NØSSKE.

27. *Neodorcadion albescens*, nova.

♂ proche de *glaucopterum*, Gnglb., mais plus large. La tête très finement ponctuée. L'épine latérale du pronotum très longue, régulièrement conique ; la bosse de chaque côté du disque du pronotum encore beaucoup plus élevée. Les élytres plus larges, plus arrondis latéralement, densément et très finement ponctués ; la crête humérale proéminente sur une plus longue étendue ; sur chaque élytre, deux fines crêtes longitudinales qui partagent l'espace entre la suture et la crête humérale en trois espaces égaux.

Noir, couvert d'une dense pubescence blanche ; la tête et le pronotum pourvus d'une étroite bande dénudée, l'écusson d'une bande semblable mais plus large. Les antennes couvertes de pubescence brune.

♀ inconnue.

Longueur : 15 mm. Largeur : 7 mm.

Type : un ♂ de Chine : province du Kan-Sou (monts Richthofen, 3.000 m.), dans ma collection.

28. *Neodorcadion multicarinatum*, nova.

♂ proche de *glaucopterum*, Gnglb. (= *Przewalskii*, Jak.), mais les joues et l'occiput beaucoup plus finement ponctués ; le pronotum beaucoup plus finement ponctué-ridé ; l'épine latérale beaucoup plus courte, étroite et non conique ; la bosse de chaque côté du disque beaucoup moins élevée. Sur chaque élytre, une dizaine de fines crêtes longitudinales, dont la première (à compter de la suture) s'étend à peine jusqu'au milieu et dont les latérales sont granulées dans leur partie prémédiane et grossièrement ponctuées ; la suture également élevée ; le fond des élytres très finement ponctué ; la crête humérale à peine proéminente.

Noir ; le front, les joues, les parties latérales du pronotum, le dessous et les jambes couverts d'une pubescence blanche ; l'occiput et le disque du pronotum d'une pubescence jaune grisâtre ; de chaque côté du vertex et du milieu du pronotum, une étroite bande longitudinale blanche ; l'écusson blanc, pourvu d'une large bande longitudinale médiane dénudée. Les élytres couverts d'une pubescence blanchâtre, mais paraissant rayés de cette couleur parce que les crêtes longitudinales et la suture restent dénudées. Les antennes couvertes de pubescence brun foncé ; les articles (à partir du troisième) largement annelés de blanc.

♀ montrant les différences normales.

Longueur : 16 mm. 1/2 à 18 mm. 1/2. Largeur : 7 mm. 1/2 à 8 mm. 1/2.

Type : un ♂ de Chine : province du Kan-Sou, dans ma collection.

29. *Neodorcadion gansuense*, nova.

♂ de stature en ovale allongé. Les antennes cassées chez les deux individus que je connais ; le scape pourvu d'une cicatrice ouverte, aussi long que

le troisième article. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus courts que les joues (chez le ♂, beaucoup plus courts qu'elles (chez la ♀). La tête très densément et finement ponctuée et ridée. Le pronotum très transverse, très densément et finement ridé, pourvu d'un large bourrelet court et lisse au milieu du bord antérieur du pronotum et d'un autre du milieu à la base, ce dernier partagé par un profond sillon longitudinal médian; l'épine latérale peu longue, étroite et pointue; de chaque côté du milieu du disque, une bosse obtuse; l'écusson petit, semi-rond. Les élytres allongés, convexes, largement arrondis au bout, densément et finement ridés, pourvus de nombreuses lignes longitudinales granuleuses un peu élevées; une crête humérale légèrement indiquée.

Noir, couvert de pubescence gris blanchâtre (plus épars sur le pronotum, sauf de chaque côté de la ligne médiane et au bord intérieur de l'épine latérale). Les lignes granuleuses des élytres plus ou moins dénudées, de telle sorte que les élytres paraissent peu régulièrement rayés.

♀ montrant les différences normales; distinctement plus large et un peu plus courte.

Longueur: 16 à 18 mm. Largeur: 6 à 8 mm.

Type: un ♂ de Chine: province du Kan-Sou (monts Richthofen, Liang-chov), dans ma collection.

30. *Thyestilla caerulea*, nova.

♀ proche de *gebleri*, Fald.; mais plus petite. Les antennes plus fines, aussi longues que le corps. Les palpes plus grêles. Le scape moins fort. Le front plat. Les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues. La tête et le pronotum densément et très finement ponctués. Le pronotum distinctement étranglé avant la base et après le bord antérieur; l'écusson trapézoïdal. Les élytres très densément et peu finement ponctués, les points très fins mais très distincts jusqu'au bout; le dernier segment abdominal pourvu d'un sillon médian plus profond.

Bleu foncé métallique; couvert d'une pubescence noirâtre épars; les poils érigés également noirs; les jambes et les antennes noires; les tarse et les antennes couverts de pubescence gris blanchâtre, sauf le bout apical de tous les articles des antennes, qui reste noir.

♂ inconnu.

Longueur: 10 mm. Largeur: 3 mm. 1/3.

Type: une ♀ de Chine: province de Sétchouen (Tatsienlou), dans ma collection.

31. *Stenostola callosicollis*, nova.

Proche de *ferrea*, Schrank, mais plus étroit. Les antennes un peu plus longues que le corps. Les lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les joues chez la ♀, plus de deux fois plus longs qu'elles chez le ♂. Le pronotum aussi long que large, pourvu de chaque côté du disque d'une petite callosité lisse un peu avant le milieu. Les élytres plus étroits. Les poils érigés des antennes très courts, sauf sur le scape.

Noir; entièrement couvert d'une fine pubescence gris blanchâtre, un peu plus dense sur l'écusson.

Longueur : 9 mm. Largeur : 2 mm. 1/4.

Type : un ♂ de Mandchourie : Handaohetzy, dans ma collection.

32. *Phytæcia* (S.-G. *Phytæcia* s. str.) **kashmirica**, nova.

Allongé. Les antennes peu fines, un quart plus longues que le corps (♂) ou un peu plus longues que lui (♀), éparsément frangées en dessous ; le scape court, peu fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape ; le quatrième distinctement plus long que le cinquième. Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues. Le front plus large que haut. La tête et le pronotum très densément et très finement ponctués ; le pronotum transverse (♂) ou très transverse (♀), pourvu d'un fin sillon transversal au bord antérieur et d'un autre au bord postérieur ; le bord antérieur un peu relevé ; les bords latéraux légèrement arrondis ; l'écusson semi-rond. Les élytres très allongés, médiocrement convexes, parallèles, un peu plus larges que le pronotum, arrondis au sommet, très densément et finement ponctués, les points très fins vers le bout ; les côtés des sterna densément et très finement ponctués. Le dernier segment abdominal de la ♀ pourvu d'un fin sillon longitudinal médian.

Noir ; couvert d'une pubescence brun olivâtre, éparsée sur le vertex et le pronotum. Sur chaque élytre, une bande longitudinale ochracée peu large, qui part du calus huméral et s'étend en devenant plus étroite et moins nette jusqu'au commencement du tiers apical et en dessous de l'épaule jusqu'à la base des épipleures. Les jambes (sauf les trois derniers articles des tarses) également ochracées et couvertes d'une fine pubescence brun rougeâtre.

Longueur : 7 mm. à 7 mm 1/2. Largeur : 1 mm. 2/3 à 1 mm. 3/4.

Type : un ♂ du Cachemire : Koulou, dans ma collection.

Chez une ♀ de même provenance, la bande élytrale ochracée est réduite à une tache ochracée allongée sur l'épaule ; la pubescence du fond est plutôt grisâtre. C'est la m. **reductevittata**, nova.

33. *Phytæcia* (S.-G. *Phytæcia* s. str.) **stenostoloides**, nova.

♀ proche de *cylindrica*, L., mais les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues ; le disque du pronotum, surtout à sa partie médiane, ponctué beaucoup moins densément ; les élytres arrondis au bout, très finement ponctués, sans lignes élevées ; le métasternum extrêmement finement ponctué.

Noir ; couvert d'une fine pubescence gris clair ; l'écusson et trois étroites bandes longitudinales sur le disque du pronotum sont blancs. Les antennes couvertes de pubescence brun foncé à partir du deuxième article.

Longueur : 8 mm 1/3. Largeur : 2 mm.

♂ inconnu.

Type : une ♀ de Transbaïkalie : Verchné-Oudinsk, dans ma collection.

34. *Phytæcia* (S.-G. *Opsilia*) **bucharica**, nova.

Proche de *cærulescens*, Scop., et ayant comme lui les mandibules bicuspidées, mais le pronotum plus transverse, sans sillon près du bord antérieur, un peu rétréci vers son bord antérieur ; la tête et le pronotum pourvus de poils érigés plus longs. Les élytres beaucoup plus allongés, trois fois et demie plus longs que la tête et le pronotum réunis (moins de trois fois

chez *cærulescens*), plus parallèles, plus étroitement arrondis au bout ; les trois premiers segments abdominaux pourvus chez le ♂ d'une petite bosse apicale au milieu de leur bord postérieur.

Noir ; couvert d'une pubescence grise ; les antennes d'une pubescence brun foncé.

Longueur : 7 à 9 mm. Largeur : 2 mm. à 2 mm. 1/3.

Type : un ♂ de Boukhara : Tchitchantan, dans ma collection.

35. *Phytæcia* (S.-G. *Opsilia*) **chinensis**, *nova*.

♂ proche de *cærulescens*, Scop., et ayant comme lui les mandibules bicuspidés ; mais les antennes plus fortes ; le scape plus fort, beaucoup moins long que le troisième article des antennes. Le pronotum un peu étranglé avant la base et après le bord antérieur, pourvu de chaque côté du disque d'un petit tubercule un peu avant le milieu. Les élytres plus allongés, trois fois plus longs que la tête et le pronotum réunis ; les poils érigés de la moitié antérieure des élytres plus courts.

Noir ; couvert d'une fine pubescence grise ; de chaque côté du disque du pronotum, une étroite bande longitudinale blanchâtre. Les antennes couvertes de pubescence brun foncé.

♀ inconnue.

Longueur : 10 mm. Largeur : 2 mm. 1/3.

Type : un ♂ de Chine : province du Petchili, dans ma collection.

36. *Phytæcia* (S.-G. *Musaria*) **kukunorensis**, *nova*.

♂ proche de *Guilleti*, Pic, mais le scape plus mince. Les lobes inférieurs des yeux deux fois plus longs que les joues. La tête et le pronotum plus étroits, densément et très finement ponctués ; le pronotum aussi large que long, sans callosités lisses ; l'écusson semi-rond. Les élytres légèrement échancrés au bout (l'angle sutural proéminent, le marginal plus proéminent, épineux) ; les deux dents métathoraciques moins prononcées, mais tout de même distinctes.

Noir ; couvert d'une pubescence brun grisâtre à lustre olivâtre ; l'écusson avec une pubescence jaune olivâtre et une tache allongée de même couleur au milieu de la base du pronotum. Les épipleures (sauf au quart apical) et une très étroite tache latérale subhumérale au quart basilaire de chaque élytre, sont jaunes, couverts d'une fine pubescence jaunâtre. Les cuisses des trois paires et les tibias antérieurs et intermédiaires jaunes avec une fine pubescence jaunâtre.

♀ inconnue.

Longueur : 9 mm. Largeur : 2 mm.

Type : un ♂ du Thibet : Koukounor, 3.200 m., dans ma collection.

37. *Phytæcia* (S.-G. *Rubrophytæcia*, novum) **moreana**, *nova*.

Allongé. Les antennes assez fortes, aussi longues que le corps dans les deux sexes ; le scape court, fort ; le troisième article aussi long que le quatrième, à peine plus long que le scape ; le quatrième distinctement plus long que le cinquième ; le onzième largement arrondi au bout. Les lobes inférieurs des yeux transverses, un peu moins longs que les joues. Le front beaucoup plus large que haut. La tête et le pronotum très densément et

très finement ponctués. Le pronotum aussi long que large (♂) ou un peu transverse (♀), convexe, trilobé à la base, pourvu de quelques points plus gros à la partie médiane du disque; ses bords latéraux légèrement arrondis; l'écusson large, semi-rond. Les élytres très allongés, médiocrement convexes, un peu plus larges que le pronotum, légèrement rétrécis dès les épaules (♂) ou dès le milieu (♀), coupés presque droit au sommet (l'angle sutural un peu proéminent), très finement et densément ponctués, les points plus épars et plus fins dans la moitié postérieure. Les sterna densément ponctués; l'abdomen et les cuisses éparsement et très finement ponctués. Les poils érigés assez longs par toute l'étendue des élytres. Le dernier segment abdominal pourvu d'un sillon longitudinal dans sa moitié basilaire (♀) ou d'une large dépression apicale (♂).

Noir; couvert d'une pubescence brun jaunâtre olivâtre; trois bandes longitudinales étroites et vagues, plus claires, sur le pronotum; l'écusson également plus clair; les tarsi couverts d'une pubescence gris foncé, les antennes d'une pubescence brun grisâtre.

Longueur : 11 mm. Largeur 3 mm.

Type : un ♂ de Morée : Nauplie, dans ma collection.

Le Sous-Genre *Rubrophytæcia*, novum, auquel appartient cette espèce, se distingue de tous les autres Sous-Genres de *Phytæcia* par ses antennes non atténuées vers le bout (le onzième article est également gros et largement arrondi au bout), et les points de ses élytres, non alignés. Le type de ce Sous-Genre est la *Phytæcia melanocephala*, F. (= *rubricollis*, Lucas).

38. *Conizonia* (S.-G. *Conizonia*) *chehirense*, nova.

♀ allongée. Les antennes fortes, atteignant à peine le commencement du quart apical des élytres; le scape assez fort; le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape; le quatrième distinctement plus long que le cinquième; les tubercules antennifères plats. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues; le front plus large que haut. La tête très densément et très finement ponctuée. Le pronotum court, transverse, trilobé à la base, densément et finement ponctué et entremêlé de plus gros points sur les côtés du disque; ses bords latéraux légèrement arrondis; l'écusson semi-rond. Les élytres allongés, médiocrement convexes, distinctement plus larges que le pronotum, légèrement rétrécis dès le milieu, arrondis au sommet, très densément et très finement ponctués, les points plus épars dans la moitié apicale; les poils érigés des élytres courts, sauf à la base; dernier segment abdominal échancré au milieu et pourvu d'un fin sillon longitudinal médian dans sa moitié basilaire.

Noir; couvert de pubescence brune; trois lignes longitudinales blanchâtres sur le vertex; trois bandes longitudinales discales blanches sur le pronotum (la médiane plus étroite que les autres); l'écusson blanchâtre. Sur chaque élytre, la strie suturale et deux très étroites bandes longitudinales discales sont brun jaunâtre; la pubescence entre la strie suturale et la partie latérale (qui est brune) est de couleur blanchâtre. Le dessous, les cuisses et les tibiai densément parsemés de petites taches dénuées; les

tarses avec une pubescence gris foncé. Les antennes avec une pubescence brun foncé.

♂ inconnu.

Longueur : 10 mm. à 12 mm. 1/2. Largeur : 3 à 4 mm.

Type : une ♀ d'Anatolie : Ak-Chéir, dans ma collection.

39. *Conizonia* (S.-G. *Conizonia*) **tauricola**, *nova*.

♂ allongé. Les antennes fortes, ne dépassant que peu le milieu des élytres ; le scape fort ; le troisième article aussi long que le quatrième ou que le scape ; le quatrième distinctement plus long que le cinquième ; les tubercules antennifères petits. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, distinctement moins longs que les joues. La tête densément et très finement ponctuée. Le pronotum finement ponctué, transverse, court, convexe, sans sillons transversaux ; ses bords latéraux assez légèrement et régulièrement arrondis ; l'écusson large, pentagonal. Les élytres allongés, convexes, un peu plus larges que le pronotum, légèrement rétrécis après les épaules ; ensuite légèrement élargis, ayant leur plus grande largeur après le milieu, arrondis au bout, peu densément et peu finement ponctués. Le dessous non ponctué ; le dernier segment abdominal pourvu d'une légère dépression médiane.

Noir ; couvert d'une assez dense pubescence jaune grisâtre, cette pubescence moins dense par places sur les élytres, qui paraissent ainsi densément marbrés de cette couleur. La pubescence plus fine sur les antennes.

♀ inconnue.

Longueur : 6 mm. 1/2. Largeur : 2 mm.

Type : un ♂ d'Anatolie : Taurus, dans la collection BREIT.

40. *Saperda* **mandschukoensis**, *nova*.

Proche de *punctata*, L., mais les antennes un quart plus longues que le corps (♂) ou aussi longues que lui (♀). Les lobes inférieurs des yeux trois fois plus longs que les joues (♂) ou aussi longs qu'elles (♀). Le front aussi large qu'un des lobes inférieurs des yeux (♂) ou deux fois plus large que ce lobe (♀). Le pronotum aussi long que large (♂), ou fortement transverse (♀) ; le bord latéral assez fortement arrondi chez la ♀. Les élytres beaucoup plus étroits chez le ♂ que chez la ♀, arrondis au bout, très densément et finement ponctués, très finement vers le bout apical.

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre ; de chaque côté du disque du pronotum, une grande tache noire allongée ; une autre un peu plus petite au milieu de ses parties latérales. Sur chaque élytre, quatre petites taches discales noires rondes : une postbasilaire, une prémédiane, une postmédiane et une au commencement du quart apical. Une tache noire ronde au bord antéro-latéral du premier, du deuxième et du quatrième segment abdominal. Les antennes (sauf le scape) couvertes d'une pubescence brun foncé.

Longueur : ♂, 9 mm. ; ♀, 12 mm. Largeur : ♂, 2 mm. 1/3 ; ♀, 3 mm. 1/2.

Type : un ♂ de Kharbine, dans ma collection.