

Schwarz. Die Mandibeln und Taster teilweise, die Flügeldecken mit Ausnahme einer mehr weniger breiten Längsbinde neben der Naht, die sich verschmälernd bis zum Beginn des apikalen Viertels reicht, die Beine und Fühler rot, dunkelrotbraun tomentiert (diese Tomentierung auf den Decken wenig deutlich). Schenkel und Schienen, zuweilen auch die ganze Unterseite eher grau tomentiert. Die Ränder der oberen Augenloben, 3 ziemlich schmale weiße Längsbinden auf der Halsschildscheibe, das Schildchen und eine schmale Nahtbinde auf jeder Decke, weiß tomentiert. Jederseits noch eine schmale weiße Binde, die von den Wangen über den Unterteil der umgeschlagenen Halsschildseiten entlang dem Seitenrand der Sterna und der Abdominalsegmente bis zum Körperende reicht.

Länge: 11—16 mm; Breite: 3½—5 mm.

Von Ménétrés nach Stücken von Baku beschrieben. — Armenien: Wan, Bitlis, Araxes-Tal (Museum München); Anatolien: Marasch, Aghir Dagh, Mardin, Malatia, (Heyden), Syrien: Aleppo (coll. Itzinger). *Sancta* Reiche und *rufobrunnea* Heyd. sind Synonyme. m. *discovittata* Breun.

Wie die Stammform, aber jede Decke mit 3 schmalen weißlichen Scheibenlängsbinden, deren innere zuweilen wenig deutlich ist. Ordubad.

9. *Ganglbaueri* Pic

Coptosia Ganglbaueri Pic, 1936, Echange, LI, no. 463, p. 3.

Phytoecia sancta Ganglbauer (nec Reiche), 1884, Best. Tab., VIII, p. 573.

Coptosia Ganglbaueri Pic, 1949, Misc. Ent., XLVI, p. 10.

m. *nigrosuturata* Heyr.

Coptosia Ganglbaueri Heyrovsky, 1950, Act. Soc. Ent. Cech., XLVII, p. 14.

m. *Vseteckai* Heyr.

Phytoecia sancta ab. *Vseteckai* Heyrovsky, 1937, Cas. cesk. Spol. Ent., XXXIV, p. 9.

Langgestreckt. Fühler viel kürzer als der Körper (♂) oder die Deckenmitte wenig überragend (♀); Glied 3 kaum länger als 4 oder 1, Glied 4 etwas länger als 5. Untere Augenloben merklich länger als die Wangen. Stirn quer, sehr dicht und fein punktiert. Halsschild quer, seitlich mäßig verrundet, äußerst dicht, fein punktiert, die Punkte stellenweise zu Runzeln verfließend. Schildchen halbrund. Flügeldecken lang, etwas breiter als der Halsschild, beim

♂ von den Schultern ab leicht verengt, beim ♀ fast parallel und erst im apikalen Viertel verengt, apikal fast gerade abgestutzt (Nahtdecke in einen sehr kleinen Dorn ausgezogen, Randedecke ver-rundet), im premedianen Nahtteil leicht abgeflacht, dicht und wenig fein punktiert, die Punkte apikalwärts feiner werdend. Letztes Abdominalsegment des ♂ mit großer dreieckiger Längsdepression. Die abstehenden Haare auf den Decken sind ziemlich lang.

Schwarz, dunkelbraun bis schwarzbraun tomentiert. Der Hinterrand der oberen Augenloben, 3 schmale Längsbinden auf der Halsschildscheibe, das Schildchen und eine schmale Nahtbinde auf jeder Decke weiß tomentiert. Jederseits weiters eine schmale weiße Binde, die von den Wangen und den unteren Teil der umgeschlagenen Halsschildseitenteile bis zum Hinterrand der Metepisternen reicht. Unterseite und Beine dunkelgrau tomentiert; je eine weiße Seitenrandmakel am Hinterrand der Abdominalsegmente 1 bis 4.

Länge: 9—11 mm; Breite: 3—3½ mm.

Von Pic nach Stücken von Jerusalem beschrieben. — Palaestina (Heyrovsky); Insel Cypern (Ganglbauer); Anatolien; Marasch, Adana (coll. Itzinger).

m. **Vseteckai** Heyr.

Wie die Stammform, aber jede Decke mit 3 weißen Scheibenlängslinien.

m. **nigrosuturata** Heyr.

Wie die Stammform, aber größer, die Flügeldecken dunkelrotbraun tomentiert mit Ausnahme einer schwärzlichen Längsbinde neben der Nahtbinde, die vor dem apikalen Ende ausläuft. Die Beine, mit Ausnahme des basalen Teiles der Schenkel, und die Fühler vom dritten Glied ab rotbraun.

Länge: 14 mm; Breite: 4½ mm. Palaestina: Dahlia (Heyrovsky).

Ich kenne diese letzte Form nur nach der Beschreibung.

10. **albovittigera** Heyd.

Phytoecia albovittigera Heyden, 1863, Berl. ent. Zs., VII, p. 130; 1869. Abeille, VI, p. 410.

Coptosia languida Fairmaire (nec Ménétrés), 1864, Gen. Col. d'Eur., IV, p. 177, pl. LV, fig. 257.

Phytoecia Reichei Kraatz, Deuts. ent. Zs., p. 287.

Phytoecia albovittigera Ganglbauer, 1884, Best. Tab., VIII, p. 555.

Coptosia semiannulicornis Pic, 1936, Echange, LI, no. 463, p. 4.

Coptosia albovittigera Pic, 1949, Misc. Ent., XLVI, p. 60.