

498 DORCADION VITTIGERUM Panz. (*Lamia vittigera*) Faun. Germ. fasc. 48, n.° 24.

— *Lamia lineata* Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 303, n.° 118.

Hab. Communiqué par M. Duponchel.

499 PARMENA PILOSA Br. — Obscure fusca, pedibus et antennis pallidioribus, profunde et crasse punctata, punctis elytrorum minus confertis; elytris transversim cinereo-bifasciatis, antennis vero cinereo-annulatis; palpis ferrugineis. — Long. 9 millim., lat. $3\frac{1}{2}$.

DESCR. Tout l'insecte est d'un brun foncé, revêtu d'un duvet grisâtre, court et serré, et de poils longs et droits de la même couleur que le duvet, mais moins serrés. Tête marquée de points enfoncés larges et profonds; labre plus finement ponctué, légèrement rougeâtre; palpes plus clairs, mandibules noires; antennes d'un brun plus clair que le corps, couvertes d'un court duvet grisâtre plus abondant à la base des articles, ce qui les rend comme annelées: de longs poils, semblables à ceux du corps, les garnissent dans toute leur longueur. Corcelet un peu plus long que large, légèrement élargi et muni d'un tubercule très-obtus sur les côtés, très-grossièrement ponctué comme la tête, mais les points plus serrés encore. Écusson triangulaire, relevé à l'extrémité, presque lisse. Élytres un peu plus larges que le corcelet à leur base, ovales, assez élevées, couvertes de points enfoncés très-gros, mais plus écartés que ceux de la tête et du corcelet; tous les intervalles qui se trouvent entre ces points sont eux-mêmes très-finement ponctués; on distingue sur chaque élytre deux bandes de poils d'un gris plus clair que le duvet: la première, en demi-cercle, part de l'angle extérieur de la base et descend jusqu'au tiers de l'élytre, où elle se recourbe; la seconde est transversale, sinuée et placée au tiers postérieur. Dessous du corps marqué de quelques gros points enfoncés très-écartés, et en outre très-finement ponctué, beaucoup moins velu que le dessus; extrémité de l'abdomen un peu rougeâtre. Pattes finement ponctuées, d'un brun un peu rougeâtre, revêtues d'un duvet légèrement grisâtre; jambes intermédiaires et postérieures échancrées en dehors vers l'extrémité et garnies de poils roussâtres dans l'échancrure.

Hab. Communiqué par M. Duponchel.

500 SAPERDA DUPONCHELII Br. — Elongata, depressa, profunde punctata, dense hirta, supra virescens, infra viridi-flavicans; antennis flavo fuscoque annulatis; thorace tuberculo laterali crasso, obtuso, linea longitudinali media lateribusque flavescens. — Long. 18 millim., lat. $5\frac{1}{2}$. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 4.)

DESCR. D'un vert foncé en dessus, plus clair et légèrement jaunâtre en dessous. Tête fortement ponctué, parcourue dans sa longueur par un faible sillon longitudinal, lequel est revêtu d'un court duvet couché, jaunâtre, plus clair sur le