

on remarque deux bandes et trois taches de poils jaunes ainsi disposées : une tache large et ovale à la base ; une bande irrégulière qui remonte obliquement vers la suture pour se réunir sous l'écusson à la bande correspondante de l'autre élytre, et forme ainsi la figure d'un chevron qui serait sinué à ses extrémités : au-dessous de cette bande on en voit une autre placée vers le milieu de l'élytre, mais elle est moins large, droite en avant, échancrée en arrière : cette bande est suivie d'un point ovalaire placé en travers, un peu moins large que chaque élytre ; le bord interne à l'extrémité est couvert d'une tache un peu plus pâle que les autres, placée obliquement à la suture ; enfin, la dernière tache est placée sur le bord externe à la base de chaque élytre et descend le long du bord jusqu'à la bande en chevron. Dessous du corps d'un châtain foncé, ainsi que les cuisses, et revêtu d'un duvet gris jaunâtre, couché et serré ; jambes et tarsi velus aussi et fauves.

*Hab.* Sur les fleurs en Juin, dans les clairières des bois.

*Obs.* Nous dédions cette espèce à notre ami M. Puillon de Bobelaye, Capitaine d'état-major, et qui faisait partie de la brigade topographique en Morée lors de notre séjour dans le pays.

481 CLYTUS ARVICOLA Oliv. (*Callidium*) Coléopt. IV, 70, p. 64, n.° 88, pl. 8, fig. 93.

*Hab.* Sur les fleurs en Juin.

482 CLYTUS ORNATUS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 351, n.° 26. — *Callidium ornatum* Oliv. Coléopt. IV, 70, p. 40, n.° 53, pl. 6, fig. 15.

*Hab.* Avec les précédents.

*Obs.* Une variété de cette espèce a la bande noire du corselet plus étroite et divisée en trois taches, dont celle du milieu est la plus petite ; la tache circulaire noire de la base des élytres est interrompue à la partie supérieure ; les deux bandes suivantes sont plus étroites ; les pattes sont revêtues d'un duvet cendré au lieu d'être jaune comme dans l'espèce.

483 CLYTUS SCALARIS Br. — Punctatus, obscure castaneus ; capite antérieur et supérieur flavo-lirto ; thorace fasciis 2 transversis ; elytris fasciis 2 et maculis 4 flavis ; scutello cinerascens albido ; corpore subtus flavo-villoso, abdominis segmentorum basi nuda ; antennis pedibusque flavescens. — Long. 11 millim., lat. 3. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 10.)

*DESCR.* Tête noirâtre, fortement ponctuée, marquée en avant d'une petite ligne enfoncée, couverte de poils jaunes sur sa partie antérieure et d'une bande de même couleur en travers sur le vertex ; palpes et antennes fauves, ces dernières légèrement velues, avec le premier article brun. Corselet globuleux, légèrement

arrondi en avant, tronqué en arrière, ponctué, de la couleur de la tête et orné de deux bandes transversales de poils jaunes, réunies sur les côtés à la partie inférieure ; quelques poils de cette couleur garnissent aussi le bord postérieur. Écusson un peu plus large que long, arrondi, couvert de poils grisâtres couchés et serrés. Élytres un peu plus larges que le corselet, légèrement rétrécies jusqu'à l'extrémité, arrondies et formant un angle rentrant vers le bout : leur surface est finement chagrinée, et surmontée d'une ou deux côtes élevées peu sensibles : leur couleur est un châtain foncé, orné de bandes et de taches de poils jaunes, disposées comme dans le *C. Bobelayei*, excepté que le prolongement latéral du chevron est moins sinué, et la bande qui le suit est au contraire sinuée au lieu d'être droite à la partie qui regarde la base des élytres. Dessous du corps d'un brun châtain garni de poils jaunes couchés et serrés, ainsi que les segments de l'abdomen, dont la base seule est nue. Pattes entièrement fauves.

*Hab.* Communiqué par M. de Laporte.

*Obs.* Des rapports nombreux semblent devoir réunir ces deux espèces, mais le *C. Bobelayei* est toujours plus grand et plus large en proportion ; il a les cuisses brunes, le dessous du corps et l'abdomen couverts de poils d'un jaune blanchâtre, tandis que le *C. scalaris* est garni en dessous de poils jaunes qui laissent à nu la base de chaque segment de l'abdomen ; en outre, les cuisses sont de la couleur des jambes et des tarsi.

484 CLYTUS FLORALIS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 346, n.° 3. — Pall. (*Cerambyx*) Iter, II, p. 724, n.° 63. — Oliv. (*Callidium florale*) Coléopt. IV, 70, p. 47, n.° 64, pl. 5, fig. 53.

*Hab.* Avec les précédents.

485 CLYTUS GAZELLA Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 348, n.° 10. — Oliv. (*Callidium*) Coléopt. IV, 70, p. 66, n.° 92, pl. 8, fig. 97.

*Hab.* Communiqué par M. Duponchel.

486 CLYTUS TRIFASCIATUS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 351, n.° 24. — Oliv. (*Callidium trifasciatum*) Coléopt. IV, 70, p. 52, n.° 70, pl. 5, fig. 59.

*Hab.* Communiqué par M. Duponchel.

487 CLYTUS MASSILIENSIS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 350, n.° 60. — Oliv. (*Callidium massiliense*) Coléopt. IV, 70, p. 55, n.° 75, pl. 6, fig. 70.

*Hab.* Communiqué par M. Duponchel.

488 CLYTUS NIGRIPES Br. — Obscure castaneus, punctatus ; thorace, capitis vertice, palpis, antennis pedibusque, femorum apice excepto, ferrugineis ; elytris fascia baseos