

rait probablement mieux placé dans cette division, mais la forme de son chaperon m'a engagé à le rapporter à la précédente. Je n'ai pas vu la femelle du *M. Obscura*.

81. *CETONIA HIRTA*. *Fab.* Insecte très-répandu dans le centre et dans le midi de l'Europe.

*Longicornes.*

82. *CERAMBYX (Monochamus) ANNULICORNIS*. *Br.* Joli insecte qui doit être placé dans le voisinage du *C. Sutor*, *Fab.*, mais qui a les élytres plus étroites en arrière et le corps généralement moins bombé. Son corselet présente de chaque côté une épine aussi forte, mais plus aiguë que dans le *Sutor*. Tout l'insecte est d'un roux obscur, revêtu de poils couchés d'un roux jaunâtre. Les antennes sont ornées de poils d'un gris jaunâtre qui entourent la base de chaque article et l'extrémité du précédent, et les font paraître annelées. Les cuisses présentent vers l'extrémité un anneau obscur ou noirâtre qui est dû à l'absence de poils. Les côtés de la face supérieure du corselet sont plus bruns que sa partie médiane. Les élytres sont parsemées d'assez gros points enfoncés, présentant deux côtes peu saillantes; le seul individu que j'aie vu est un mâle; il a huit lignes de longueur.

83. *CERAMBYX (Monochamus) ALBIDUS*. *Br.* Insecte qui a la forme du précédent, mais qui est encore plus étroit que lui. Les épines de son corselet sont moins saillantes et son corps est entièrement revêtu de poils blanchâtres courts et couchés. Son corselet est parsemé de tubercules, et ses élytres offrent une grande quantité de points enfoncés, et de plus les rudimens d'une côte qui n'est visible que vers les deux tiers. Les antennes et les pattes sont d'un brun plus clair que le reste du corps; les cuisses présentent un anneau peu distinct qui est dû à l'absence des poils. Je n'ai vu que le mâle; il est long de huit lignes comme le précédent.

84. *CALLIDIUM (Arhopalus) RUSTICUM*. *Fab.* Insecte du midi de l'Europe et de la France en particulier.

85. *CALLIDIUM (Arhopalus) BAJULUS*. *Fab.* Insecte répandu dans une grande partie de l'ancien continent, dans le nord de l'Afrique et même dans l'Amérique septentrionale.

86. *CALLIDIUM (Hosparophanes) RORIDUM*. *Br.* Belle espèce, qui se rapproche du *C. Mixtum*, *Fab.*, mais qui a le corselet bien plus large en proportion de sa grosseur. Il est revêtu d'un duvet blanc et moins serré dans certains endroits que dans d'autres. On aperçoit à travers ce duvet la granulation assez forte du corselet et des élytres. Ces élytres offrent les rudimens d'une côte plus marquée dans le mâle que dans la femelle. Les deux sexes se reconnaissent, non pas à la longueur des antennes, mais à la forme du corselet, qui est elliptique dans la femelle, et trapézoïdal dans le mâle. Les côtés du corselet sont un peu inégaux dans la femelle, et présentent de gros points enfoncés, outre trois petites lignes élevées vers la base. Le corselet du mâle, plus large en avant qu'en arrière, et couvert d'un duvet plus serré que le reste du corps, offre en arrière trois courts sillons longitudinaux, et quelques taches noires sur sa partie dorsale. L'insecte n'a pas tout-à-fait un pouce de longueur.

87. *LAMIA (Acanthoderus) GIBBA*. *Br.* Espèce fort remarquable, et qui formerait