

*Leptura oblongomaculata*, Buq.

Long., 17 millim. ; larg., 5 3/4 millim.

Cette espèce ressemble assez à la *Lep. rubrotestacea*; mais elle est proportionnellement plus courte, et d'un rouge plus foncé en dessus. Les élytres ont chacune, à peu près au milieu, une tache noire, oblongue et placée longitudinalement. Elles sont plus larges que le corselet à la base, à angles huméraux arrondis, entièrement couvertes d'une ponctuation fine et serrée, et échancrées obliquement à l'extrémité. Le dessous du corps est d'un noir luisant, à reflets gris et soyeux. La tête, les antennes, les pattes et les trois derniers segments abdominaux sont d'un rouge plus foncé que les élytres.

Elle m'a été envoyée par M. Gérard, qui l'a trouvée à Stora.

Le travail dont je me suis occupé dernièrement sur les coléoptères d'Algérie m'ayant amené à reconnaître qu'une foule d'espèces de cette provenance se rencontraient aussi dans le midi de la France, en Espagne, en Sicile et en Sardaigne, j'ai cru utile d'en dresser le catalogue et de le soumettre à la Société.

Cicindela	maura,	Fabr.
—	flexuosa,	Fabr.
—	sardea,	Dahl.
—	trisignata,	Illiger.
Drypta	emarginata,	Fabr.
Cymindis	lineata,	Schon.
—	mauritanica,	Dej.
Scarites	pyracmon,	Bonelli.
—	planus,	Bonelli.
—	lævigatus,	Fabr.