

—Allongée; parallèle, d'un rouge testacé, avec les antennes, une large bande longitudinale naissant à la base des élytres, passant sur le calus huméral et prolongée jusqu'à l'extrémité, la majeure partie des jambes et des tarses noirs. Tête et prothorax grossièrement ponctués. Élytres presque sérialelement ponctuées.

Cette jolie espèce a été découverte, cette année, à Meung, près Orléans, par M. Maire, botaniste distingué et non moins zélé entomologiste.

Oberea pedemontana. — Long., 13 mill.; larg., 2 1/2 mill. Mâle. Noire; palpes, prothorax, écusson, élytres avec une tache scutellaire trigone émettant un petit trait longitudinal externe; dessous du corps et pattes d'un jaune rougeâtre; milieu de la poitrine et presque la totalité du dernier segment anal noirs; deuxième et troisième segments offrant, sur chaque côté, une tache noirâtre obsolette. Tête très-serrément ponctuée, sillonnée sur le front. Élytres très-fortement et sérialelement ponctuées jusqu'aux 4/5 de la longueur, obliquement tronquées de la marge à la suture.

Piémont. Cette intéressante espèce, qui est voisine, mais plus amincie que l'*O. pupilla*, m'a été donnée, dans le temps, par feu Cordier.

DESCRIPTION de LONGICORNES NOUVEAUX du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique; par M. A. CHEVROLAT.
(Suite. — Voir 1855, p. 183, 282, 513; 1856, p. 340.)

47. *Callichroma episcopale planiusculum*, nigrum, capite violaceo, antennis planatis pedibusque clavatis nigro-cyaneis; tibiis quatuor auticis tarsisque totis cinereis; thorace viridi, elongato, transversim rugato, lateribus posticis spinoso; elytris lata vitta communi et abbreviata virescente; corpore infra viridi, lanugine alba induto. — Long., 17 mill.; lat., 5 mill.

Moyen, aplati. Tête d'un beau violet, brusquement tronquée et élevée entre les antennes, carrément rebordée en