

DESCRIPTION d'une nouvelle espèce de Coléoptère longicorne, par M. A. CHEVROLAT.

TETROPS STARKII, alata, acute et grosse punctata, hirta; pedibus (basi excepta) elytrisque luteis; his ad basin, marginem et apicem nigri. — L. $4 \frac{1}{3}$; l. $1 \frac{2}{3}$ mill.

Elle ressemble beaucoup à la *T. præusta*, Lin., mais est d'un tiers ou d'un quart plus grande que les plus grands individus de cette espèce; le noir est plus profond, très-brillant; la ponctuation est plus forte, plus arrondie, serrée sans se confondre et non disposée en stries longitudinales sur le côté des étuis. Noire, densément velue. Tête en carré transverse en dessus, couverte de petits points profonds, réguliers; lisse, imponctuée entre les antennes, carrée et faiblement convexe en devant et d'un noir terne; parties de la bouche, yeux et antennes noirs. Corcelet offrant les mêmes ponctuation, villosité et coloration que la tête, plus allongé que chez la *T. præusta*, à callosité latérale et postérieure plus relevée, impressionnée en dedans d'une ligne arquée, le sillon qui longe la base est plus étranglé; celle-ci est lisse en dehors, ponctuée, et comme striolée au milieu. *Ecusson* noir. *Elytres* jaunâtres, avec la base étroitement, la marge assez largement jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de la longueur, et le 7^e terminal noirs. Corps en dessous d'un noir brunâtre, à villosité blonde. *Pattes* testacées, noirâtres à leur naissance.

Cette espèce, qui a été trouvée sur les Alpes de la Bavière, m'a été envoyée par M. Stark, à qui je suis heureux de la dédier, comme témoignage de ma reconnaissance pour les envois fort intéressants que j'ai reçus de lui.

II. SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS.

Séance du 5 décembre 1859. — M. Flourens lit une Note