

longitudinalement convexes, arrondies sur chaque extrémité ou tronquées obtusément au sommet. *Pattes* de moyenne longueur; cuisses à massue effilée, les postérieures dépassant les étuis du tiers ou du quart de leur étendue; genoux postérieurs étroitement carrés; jambes droites, terminées par 2 ergots raides, aigus, et dont l'interne est un peu plus court; tarses à 1^{er} article des médians, et surtout des postérieurs, du double plus long que les suivants réunis; crochets simples, arqués, aigus. *Hanches antérieures* globuleuses. *Cavités cotyloïdes* oblongues, transverses, anguleuses en dehors. *Sternum* allongé, parallèle, arrondi en devant, tronqué au sommet et quelquefois échancré en dedans. *Abdomen* de 5 segments décroissant de grandeur, les 4 premiers ornés de bandes jaunes.

Devront rentrer dans ce genre les *Clytus gazella* Lin., *arietis rhamni* et *temesiensis* Germ., *lama* Muls., *clavicornis* Reiche, comme espèces européennes; et les *Cl. marginicollis* Lap. et Gory, (*vespoides* Dej.) et *arvicola* Ol. (*hamatus* Say, *capreolus* Dej.), de l'Amérique du Nord.

150. *Sphagesthes ciliciensis*.

Affines certe *Clytus rhamni* Germ., creberrime punctulatus, coriaceus, niger, nitidus; margine tenui antico et postico prothoracis, scutello, elytrorumque fasciis duabus luteis (1^a antice ad suturam angulata), antennis pedibusque ferrugineis.

Long^o 7., Lat^o 1 2/3 mill. Caramanie, (Tarsous).

Voisin du *Clytus rhamni* Germ.; d'un noir profond, un peu brillant, offrant une ponctuation fine, serrée et chagrinée. *Tête* tronquée, offrant sur le devant un léger sillon longitudinal paraissant glabre. *Palpes*, *Lèvre*, *Antennes* et *Pattes* de couleur ferrugineuse. *Chaperon* luisant sur son bord, légèrement cintré. *Prothorax* globuleux, chagriné, étroitement frangé de poils d'un jaune pâle en avant et en arrière. *Ecusson* sub-arrondi, aigu au sommet, jaune, à base noire. *Elytres* n'ayant que deux bandes jaunes: 1^{re} arquée, commençant à la marge au tiers antérieur, anguleuse sur le haut de la suture; 2^e au-delà du milieu, un peu oblique, s'arrêtant près de la marge et de la suture; sommet arrondi sur la suture, noir; calus huméral petit, élevé, lisse, portant en dedans une dépression carrée. *Sternum*, *Métasternum*, une

tache latérale sur la poitrine, et trois bandes abdominales, de couleur blanche. *Pattes* revêtues d'une pubescence blonde assez fournie; cuisses rugueusement ponctuées.

Cette espèce m'a été donnée par M. Wachanru, qui l'a rapportée de son voyage en Caramanie.

On pourrait supposer que cet insecte n'est qu'une variété du *Clytus rhamni* Germ., dont le point huméral et la bande apicale des élytres feraient défaut, mais ici la forme de la tache du sternum est terminée en pointe, et le chaperon est cintré.

151. *Sphagesthes capra*.

Ater, thorace globoso, antennis, tibiis tarsisque fulvis, elytris fasciis flavis (secunda antrorsum arcuata) apice rotundatis, muticis.

Long^o 12 1/2., Lat^o. 2 mill. Sibérie.

Callidium capra. Germar, Nov. Spec. Ins. 518.

Lap. et Gory, Mon. p. 61, pl. 12, fig. 71.

Ad. White Cat. Brit. Mus. p. 269, N^o 88.

Clytus sibiricus. Dej. Cat. 3^e éd. p. 556.

De la collection de l'auteur.

EPODUS, J. Thomson.

Corps ailé, étroit, allongé. *Tête* aussi longue en arrière qu'en avant, tronquée et carrée antérieurement, munie de deux petits tubercules entre les antennes. *Palpes labiaux* à dernier article en cône renversé court et étroit, celui des *Maxillaires* subcylindrique, tronqué. *Mandibules* simples, moyennes, étroites, arquées, aigües. *Yeux* oblongs, élargis par le bas sur le devant, profondément lunulés en dessus vers le milieu interne. *Antennes* un peu plus longues que le corps, de onze articles allongés: 5^e à 5^e faiblement noduleux au sommet, suivants aplanis, étroits, 5^e très-long muni d'une petite épine. *Prothorax* allongé, étroit, hautement globuleux en dessus, droit et étroitement rebordé en avant, aminci et cintré sur la base qui, sur le dedans de l'angle, est coupée obliquement en arrière. *Ecusson* allongé, terminé en pointe. *Elytres* étroites, deux fois aussi longues que le prothorax, rectangulaires et élevées sur l'épaule, faiblement amincies vers