

*clauipes*. 7. C. nigrum opacum, femoribus omnibus clauatis, antennis longioribus.

*violaceum* 8. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis breuibus.

*femora-tum*. 9. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus.

*2 fascia-tum*. 10. C. thorace pubescente atrum, elytris fasciis duabus rufis.

Habitat in America occidentali Mus. Dom. Banks.

Magnitudo et statura C. violacei. Antennae longitudine corporis atrae articulorum apicibus utrinque bispinosis. Thorax bituberculatus, pubescens, ater. Elytra atra in medio fasciis duabus rufis. Pedes nigri femoribus vix clauatis.

Variat interdum loco fasciae posticae macula marginali rubra.

*acuminatum*. 11. C. thorace verrucoso nigricante, elytris acuminatis viridibus: sutura cyanea.

*russicum*. 12. C. thorace verrucoso nigrum, elytris testaceis: macula media apiceque nigris.

*variabile*. 13. C. thorace glabro, corpore fusco aeneo, antennis pedibusque fuscis.

*sericeum*. 14. C. thorace mutico holofericeo cinereo, elytris testaceis: punctis eleuatis rubris.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Maius C. rustico. Antennae sericeae corpore sublongiores. Caput, thorax, corpus et scutellum cinereo holofericea. Elytra minus villosa, subtestacea punctis plurimis sparsis, eleuatis, glabris, rufis. Pedes sericei.

*rusticum*. 15. C. thorace nudo, corpore Jufido, antennis breuibus.

*agreste*. 16. C. thorace nudo nigrum, elytris striatis fuscis, antennis breuibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. rustici at duplo minor et elytra striata, fusca.

*stigma*. 17. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laeuis: stigmate albo.