

Habitat frequens in Galliae Sambuco D. Broussonet.
Nimis affinis L. triftri at duplo minor. Elytra haud
scabra sed quasi holofericea. Antennae multo bre-
uiores.

punctator. 39. L. thorace spinoso atra, elytris albo punctatis, anten-
nis longis.

Cerambyx chinensis Forst. nou. sp. Cent. I. 39.

Cerambyx farinosus Drury. Ins. 2. tab. 31. fig. 4.

cripa. 40. thorace spinoso, elytris lineis tribus eleuatis ferrula-
tis, antennis mediocribus, corpore cinereo.

rotator. 41. L. thorace spinoso cinerea, elytris subfasciatis, anten-
nis mediocribus.

Glycyrrhizae. 42. L. thorace spinoso nigra, elytris albo lineatis bicari-
natis, pedibus ferrugineis, antennis breuibus.

Cerambyx ouatus Sulz. Ins. tab. 5. fig. 9?

cruciata. 43. L. thorace spinoso nigra, coleoptris cruce media alba,
Cerambyx cruciatus Pall. Icon. tab. F. fig. 5.

Habitat in Rossia australiori Dom. Boeber.

Statura omnino L. fuliginatoris at paullo maior. An-
tennae breues, nigrae. Caput nigrum. Thorax
acute spinosus niger linea dorsali alba. Coleoptra
nigra futura lata fasciaque media abbreviata albis.
Pedes nigri.

fuligina- 44 L. thorace subspinoso nigra, elytris cinerascentibus,
tor. antennis breuibus.

Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 30.

Variat aetate tota nigra lanugine cinerea derafa.

cineraria. 45. L. thorace spinoso cinerascens, antennis breuibus.
Pallas Icon. tab. F. fig. II.

Habitat in Russia meridionali Dom. Hybner.

Statura et summa affinitas praecedentis, at duplo fere
minor et totum corpus cinerascens.

carinata. 46. L. thorace spinoso nigra, elytris piceis: carina late-
rali eleuata albida, antennis breuibus.

coquus. 47. L. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis
atris antice ferrugineis, antennis mediocribus.

rufipator. 48. L. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis,
elytris fuscis cinereo variegatis.