

- linearis.* 9. *S. cylindrica* nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6.
- cylindrica* 10. *S. cylindrica* nigra, pedibus anticis luteis.
- melanocephala.* 11. *S. thorace* cylindrico rufo, corpore nigro, pedibus rufis.
Habitat in Africa Dom. Vahl.
Statura et magnitudo praecedentis. Antennae mediocres, nigrae. Caput, corpus, elytra nigra. Thorax et pedes rufi.
- pilicornis.* 12. *S. thorace* rotundato violacea, antennarum articulo primo secundoque clauato pilosis.
Pall. Icon. tab. F. fig. 14.
Habitat in America meridionali Dom. Hybner.
Paullo maior *S. cylindrica*. Antennae corpore paullo longiores articulo primo incuruo eleuato, nigro, hirtio, secundo basi subferrugineo apice clauato, nigro, hirtio, reliquis basi ferrugineis apice nigris. Corpus violaceum, immaculatum. Pedes nigri.
- erythrocephala.* 13. *S. thorace* rotundato villoso rufa, antennis pectore elytrisque nigris.
Cerambyx erythrocephalus Schrank. Inf. aust. 270.
Habitat in Germania Dom. Hybner.
Statura et magnitudo *S. cylindricae*. Caput rufum maxillis antennisque nigris mediocribus. Thorax cylindricus, valde villosus, rufus margine antico posticoque nigris. Elytra glabra, nigra. Pectus nigricans. Abdomen rufum basi nigrum. Pedes rufi.
- fasciata.* 14. *S. thorace* subspinoso cyanea, elytris fasciis duabus flauis.
- clauicornis.* 15. *S. thorace* rotundato viridis, elytris maculis tribus flauis.
- longipes.* 16. *S. thorace* subgloboso violacea, antennis longioribus, femoribus clauatis.
- latipes.* 17. *S. thorace* subgloboso nigra, femoribus clauatis apice violaceis, tibiis posticis compressis, antennis longioribus.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Prof. Leske.