

Tota nigra. Abdomen serico albo nitet.

Variat pedibus nigris & testaceis.

^{19.} L. nigra humeris abdomineque ferrugineis. *humeralis.*

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura L. 4. guttatae at duplo fere major. Pedes nigri.

^{20.} L. nigra elytris puncto baseos lineaque media exclamatis flavis. *exclamationis.*

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Parva. Caput & thorax atra, nitida, immaculata.

Elytra truncata, nigra puncto baseos lineolaque media lunata flavis. Abdomen argento villosum. Pedes nigri.

^{21.} L. cinerea elytris testaceis: futura nigra. *futuralis.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Antennae testaceae, apice nigrae. Caput, thorax, abdomen cinereo villosa. Elytra laevia, testacea futura sola atra. Pedes rufi geniculis nigris.

^{22.} L. nigra scutello albo. *scutellata.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Corpus nigrum solo scutello albo aut fulvo.

Elytra apice emarginata. Abdomen serico albo nitet.

^{23.} L. ferruginea elytris testaceis. *lurida.*

Habitat in sylvis Hercinia Dom. Helwig.

Praecedentibus minor. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra testacea. Corpus rufum femoribus apice nigris.

^{24.} L. nigra femoribus basi rufis. *femorata.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput, thorax, elytra, corpus nigricantia, minime nitida. Pedes nigri femoribus basi rufis. Tibiae anticae etiam rufae.

Variat pedibus omnibus nigris femorum annulo tantum rufo.