

Statura magna praecedentium. Antennae nigrae. Caput et thorax immarginata, glabra, nigra cupro obscure nitida. Elytra striata, aenea, nitida. Corpus oblicurum. Pedes inerimes, nigri.

11—12. *T. oblongus ater nitidus elytris striatis. variabilis.*

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Mus.
Dom Lund.

Corpus medium reliquis longius. Antennae obscurae, omnino moniliformes. Caput et thorax plana, laevis, atra, immaculata. Elytra striata stris laevibus. Pedes inerimes. Variat corpore ferrugineo nullo modo distinctus.

15—6. *T. alatus laevis ferrugineus ore antennis brunneus, que nigris.*

Habitat in Indiis Dom. Mauerhoff.

Statura omnino *T. culinaris* at duplo maior. Antennae breves, nigrae. Mandibulae exsertae, validae, nigrae. Caput et thorax laevis, glabra, ferruginea, immaculata. Pedes ferruginei.

19—20. *T. ater laevis capite rotundato.*

glabratus.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Parvus, totus ater, glaber, nitidus. Clypeus rotundatus.

15—6. *T. ater elytris laevibus: macula baseos elliptica, transversa sanguinea.*

Habitat in Carolina sub arborum corticibus
Dom. Bose.