

tra cyanea, apice acuminata. Corpus viridi-aeneum, pedibus cyaneis.

*longipes.*

17. *C. thorace subspinoso cyaneo, viridis, antennis longioribus, femoribus clauatis.* Ent. syst. 2. 255. 12. \*

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 3.

Degeer Inf. 7. tab. 49. fig. 7.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

*cyanicornis.*

18. *C. thorace subspinoso, viridis, nitens, antennis breuibis coeruleis, femoribus anticis clauatis, ferrugineis.* Ent. syst. suppl. 142. 12. \*

Habitat in Aquapim Guineae. Mus. D. Lund.

*interruptus.*

19. *C. thorace spinoso, ater, elytris maculis tribus linearibus albis, antennis breuibis.* Ent. syst. 2. 255. 13. \*

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 133.

Habitat - - Mus. D. Olivier.

*Cerdo.*

20. *C. thorace spinoso, rugoso, niger, elytris rotundatis, antennis longis.* Ent. syst. 2. 255. 14.

*Cerambyx Cerdo.* Linn. syst. Nat. 2. 629. 39.

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 65.

Geoff. Inf. 1. 201. 2.

Voet. Col. 2. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europa.

*beros.*

21. *C. thorace spinoso rugoso, niger, elytris subspinosis piceis, antennis longis.* Ent. syst. 2. 255. 15.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 200. 1.

Frisch. Inf. 1. 13. tab. 8.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Voet. Col. 2. tab. 5. fig. 9.

Roff. Fn. Etr. 1. 141. 358.

Habitat in Europae Quercu.

22. *C. thorace subspinoso, niger, elytris viridibus, spinicornis apice spinosis.* Ent. syst. 2. 256. 16. \*

*Cerambyx torridus.* Oliv. Inf. 67. tab. 14. f. 95.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

23. *C. thorace spinoso rugosoque, nigricans, elytris denticornis bidentatis, antennis spinosis mediocribus.*

Habitat in Guinea. D. Hesse. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. Bati.* Antennae longitudine corporis, nigrae: articulis apice spinosis. Caput nigrum. Thorax spinosus, rugosus. Elytra bidentata, nigra, pube cinerascete micantia.

24. *C. thorace subspinoso, ater, antennis mediocribus, rufo nigroque annulatis.* Ent. syst. 2. 256. 17. \*

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 32.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Olivier.

25. *C. thorace rugoso, ater, elytris laeuibis bidentatis.* *bidens.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. Cerdonis*, at duplo minor. Antennae corpore breuiores, nigrae, piceo colore nitentes. Caput atrum. Thorax rotundatus, muticus, punctato-rugosus. Scutellum cinereum. Elytra laeuia, nigra, apice bidentata. Corpus nigrum, piceo micans.

26. *C. niger, thorace spinoso tuberculatoque, elytris basi scabris apice emarginatis, antennis longis.* *tuberculatus.* Ent. syst. suppl. 141. 17. \*

Habitat in Cayenna. D. Cuvier.

27. *C. thorace inermi rugoso, niger, elytris cinereis, antennis breuibis.* *voluulus.*

Ha-