

fimo. Caput nigrum, ore lineaque inter anten-
nas ferrugineis. Thorax holofericeus, niger, la-
teribus rufis. Elytra nigra, macula magna ba-
seos cum thoracis margine coëunte fasciaque
mediaque ferrugineis. Corpus nigrum, pedibus
flauescientibus.

61. S. capite thoraceque rufis, nigro-punctatis, ely- *Argus.*
tris griseis, immaculatis.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 2.

Habitat in Hungaria. Dom. de Meyerle.

Paullo minor S. tremula. Antennae corpore bre-
uiores, nigrae. Caput rufum, puncto medio
frontali tribusque baseos nigris. Thorax rotun-
datus, rufus: punctis septem 4. 3. eleuatis,
glabris, atris. Elytra pubescentia, grisea. Cor-
pus griseum, ano late rufo. Pedes rufi femo-
ribus, puncto apicis nigro.

62. S. fusca, pedibus testaceis, antennis longissimis, *longicornis*
nigris: annulo albo. Ent. syft. 2. 315. 41. ♀

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

63. S. fusca, antennis obscuris, pedibus testaceis. *flavipes.*

Habitat in Tanger. Dr. Schousboe. Mus. D. de
Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae
obscurae: articulo primo longiori, nigro. Ca-
put, thorax, elytra subtruncata, nigra, imma-
culata. Pedes testacei.

64. S. fusca, cinereo-trilineata, antennis longissimis. *antennata.*

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Corpus tenue, elongatum. Antennae corpore du-
plo longiores, fuscae. Caput et thorax fusca,
lineis tribus cinereis. Elytra piceo-fusca, li-
neis obsoletis, cinereis, apice rotundata.

65. S. niuea, dorso atomisque numerosissimis atris. *irrorata.*

Habitat in Jaua. Mus. Dom. Bosc. Paul-