

morum basin tantum obtegentes. Tarsi simplices, graciles. Antennæ liberæ, elongatæ, serratæ, articulis secundo, tertioque minutis, æqualibus.

Genus *Hypocælo* affine, pedibus tarsisque gracilibus, et antennarum articulo tertio distinguendum.

*H. castaneus*. Long. 42 mill. — Totus castaneus, pube brevi flavo-grisea indutus, capite, scutello prothoraceque dense punctatis; elytris punctato striatis, interstitiis planis densè punctatis. — Sicilia.

4. *GEOTRUPES TYPHÆOIDES*. Long. 24 mill. — Niger, nitidus, vertice antice acuto, in dente minuto prominente, prothorace tripinoso, spinis lateralibus elongatis, gracilibus, medio dentatis; elytris punctato-striatis. — Marocco.

*G. Typhæo* valdè affinis, sed verticis forma, spinarum longitudine et corpore supra deplanato distinguendus.

5. *CRYPTICUS VIATICUS*. Long. 5 mill. 1/2. — Planiusculus, oblongus, piceo-brunneus. Satis nitidus, prothorace elytris paulo latiore cum capite dense ac tenuiter punctato, margine postico utrinque puncto impresso; scutello triangulari, tenuissimè punctulato; elytris apicem versùs attenuatis, sat fortiter crenulato striatis. — Hispania.

6. *PURPURICENUS FERRUGINEUS*. Long. 10 mill. — Ater, prothorace brevi, valde rugoso, utrinque obsolete dentato; elytris pallide ferrugineo-testaceis, macula communi nigra, postice dilatata, antice hastata. — Hispania.

7. *CASSIDA NIGRICEPS*. Long. 5 mill. — Viridis, fere hemisphærica, elytris irregulariter punctatis, subtùs flava, capite nigro, antennis flavidis, suprâ fuscis, pedibus flavo-viridibus. — Hispania.

NOTE sur le résultat le plus important des études séricicoles faites avec le concours de M. Eugène ROBERT, à la magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle (Basses-Alpes). — Extrait du Journal d'observations scientifiques et pratiques de la campagne de 1854, par M. F.-E. GUÉRIN-MÉNEVILLE.

En attendant qu'il me soit possible de terminer la rédaction d'un Mémoire sur mes travaux séricicoles de cette