

*ticis latis, acutis, leviter retrorsis, margine antico sat fortiter emarginato, angulis anticis productis, margine laterali leviter arcuato, dorso dense sat tenuiter punctato, punctis ad marginem posticum majoribus, ad margines laterales majoribus et rugosis; scutello triangulari, punctulato; elytris oblongis, tenuiter densissime punctato-granulatis, sutura parum et anguste elevata, utrinque costis 3 angustis, elevatis, lævibus, duabus primis post medium conjunctis, externa basin haud attingente, margine externo acuto, margine reflexo parce ac tenuiter asperulo; subtus sat dense et sat tenuiter punctato-asperula; tibiis anticis extus haud denticulatis, apice extus in dente obtuso productis.*

♂. *Angustior, prothorace paulo longiore, lateribus minus arcuatis, elytris subparallelis.*

♀. *Prothorace brevior, lateribus magis rotundato, antice magis angustato, elytris magis ovalis et magis convexis.*

Fez.

114. *CRYPTICUS PUNCTATOLINEATUS.* — Long. 6 mill. — *Oblongus, convexus, antice paulo latior, fusco-brunneus, sat nitidus, glaber, pedibus antennisque piceo-rufescentibus; capite prothoraceque densissime tenuissime punctatis, hoc amplo, longitudine dimidio latiore, antice tantum leviter angustato et arcuato, postice elytris fere latiore, margine postico late sinuato, angulis fere obtusis, anticis rotundatis, limbo rufescenti-piceo; scutello parvo, medio punctato; elytris post medium attenuatis, striato-punctatis, punctis sat grosse, striis parum impressis, intervallis lævibus, postice præsertim convexiusculis; subtus dense punctatus.*

Fez.

Ressemble un peu au *C. gibbulus*, mais bien plus étroit, plus convexe, plus atténué en arrière, avec le corselet plus ample, plus arrondi sur les côtés en avant, et les élytres à stries peu profondes, mais fortement ponctuées.

115. *PHYTÆCIA GOUGELETH.* — Long. 10 à 12 mill. — *Elongata, postice leviter attenuata, supra planata, tota fusco-nigra, vix nitida, tenuiter griseo-pubescentis, corpore subtus densius pubescente, subsericante;*

*capite dense ac fere rugose punctato, medio leviter late impresso, lineola media longitudinali leviter elevata, antennis sericantibus, subtus parce hirtulis, prothorace quadrato lateribus fere rectis, obsolete undulatis, densissime sat tenuiter punctato, scutello fere truncato, tenuissime punctulato, elytris apice angustatis, ♂ truncatis, ♀ rotundatis, ab humeris leviter attenuatis, dense punctatis, extus longitudinaliter convexiusculis; subtus subtilissime dense punctulata.*

♂. *Antennis corpore paulo longioribus, articulis 3-10 apice setosis, abdominis segmento ultimo late excavato.*

♀. *Antennis corpore brevioribus, abdominis segmento ultimo nitidiore, convexo, minus dense ac grossius punctato, basi tenuiter sulcatulo.*

Maroc.

Cette *Phytæcia* est voisine des *P. flavipes* et *femoratis*; elle s'en distingue facilement par la coloration et par les articles des antennes munis à l'extrémité de soies spinuliformes.