

granuleuses; les taches sont presque semblables, un peu plus courtes en avant; les postérieures sont beaucoup plus petites, presque ovales. La teinte de ces taches est plus blanche, moins bleuâtre. — Guinée.

Je n'ai vu qu'un individu de cette espèce; mais la coloration du ventre est très caractéristique.

Dichostathes tubericollis. — Long. 19 mill. — Oblongus, convexus, pube densa albido-cineracea vestitus, prothorace medio magis albido, lateribus pallide rufulo-brunneis, scutello albido, elytris basi rufulis, brunneo punctulatis et utrinque maculis 2 atropenicillatis, dorso medio paulo pallidior et paulo post medium puncto atropenicillato utrinque signato, postice rufulo vage vittulato et punctulato; capite rufulo-pubescente, medio striato; antennis corpore parum longioribus, rufulis, brunneo punctulatis, articulis apice breviter pallidis, subtus ciliatis; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus utrinque bidentatus, dente posteriore majore, dorso inæquali, utrinque bituberoso, antice et postice transversim depresso, basi transversim bisulcato, margine postico utrinque sinuato; scutello fere truncato; elytris ad humeros obtuse productis, apice tantum angustatis et subtruncatis, basi et lateribus punctis grossis parum profunde impressis, dorso et postice paulo nervulatis; subtus cum pedibus grossius pubescens, griseus, rufulo et brunneo punctatus, segmentis ventralibus apice dense rufulo pilosis, pedibus validis, tibiis intermediis extus a medio fusco-velutino cristatis. — Sénégal (de Rochebrune).

Ressemble à *D. subocellatus* Fairm., mais distinct, outre la saillie plus faible et la coloration du corselet, par les houppes de poils noirs qui ornent les élytres.

Sternotomis callais. — Long. 21 mill. — Oblonga, postice attenuata, lacteo-virescens, prothorace et elytris medio interdum croceo pallide tinctis, suturis et costulis denudato-nigris; capite antice quadrato, medio carinula tenuissima et utrinque striga denudata nigris, basi anguste nigra, oculos valde approximatis, subtus vitta et tuberculis antennariis denudato-nigris; antennis nigro-fuscis, articulo 1°, interdum 2° subtus cæruleo-tinctis; prothorace elytris angustiore, lateribus medio fortiter angulato-producto et utrinque costa nigra transversim signato, dorso antice et postice transversim sulcatulo, margine postico utrinque fortiter sinuato; scutello late triangulari, apice obtuso; elytris basi ante humeros emarginatis, his oblique truncato-productis et nigro bicallosis, intus punctis aliquot impressis, dorso utrinque costulis 2