

bus obsolete albicante-pilosus. Scutellum transversum, postice obtuse rotundatum, supra parum convexum, basi atrum, postice totum densissime albo-pilosum, sed pilis brevissimis et valde condensatis. Elytra a thorace concinne remota eoque paullo angustiora, postice sensim angustata, apice parum dehiscentia, singulatim rotundata, humeris nonnihil elevatis, gibbis; atra, tomentosa, supra convexa, certo situ obscure fusca, in singulo sub humero vitta abbreviata angulari alba, supra callum humerale puncto parvo, transverso, sub-detrito, pone scutellum altero majori, communi, dein paullo ante medium duobus transversim positis, fascia angustissima valde arcuata suturam sed marginem haud attingente paullo pone medium, posterius iterum puncto communi alteroque latera versus et in ipso apice interiore lineola marginali albis. Corpus subtus atrum, sub-nitidum, pilis testaceis, rigidis vestitum; pectore maculis utrinque et segmentorum lateribus fasciis latis albis e pilis brevissimis condensatis ornatis. Pedes longiusculi, validi, nigri, parce pilosi, obsoletissime et minutissime sed dense punctati; femoribus sub-clavatis, nigris; tarsis ferrugineis, subtus densissime rufo-spongiosis; tibiis piceis.

485. *Clytus Faldermanni* DEJEAN. Tab. VIII. f. 3.

Niger, densissime cinereo-pubescent; antennis pedibusque cinereo-ferrugineis; thorace elongato, tri-maculato; elytris lunula humerali, fasciisque duabus latis nigro-fuscis, quarum fascia media interrupta.

Longit. $3\frac{5}{6}$ — 6 lin. Lat. $1 - 1\frac{1}{2}$ lin.

Statura et pictura C. Verbsci, sed paullo brevior et latior;

colore nec non elytrorum fascia media semper interrupta præcipue differre videtur.

Caput elongatum, nigrum, pube densissima valde depressa cinerea vestitum, inter oculos granulatum, vertice nudum, creberrime punctulatum, fronte inter antennas elevata, in medio sat profunde excavata. Oculi majores, modice prominuli, nigri, antice profunde emarginati. Antennæ corporis dimidium parum superantes, crassiusculæ, filiformes, ferrugineæ, pube brevissima cinerea dense tectæ. Thorax latitudine paullo longior, cylindricus, lateribus dilatatus, ampliato-pulvinatus, basi apiceque truncatus, supra æqualiter valde convexus, ubique confertissime ac minutissime punctatus, pube cinerea densa valde depressa obductus, macula magna subtransversa, fusco-nigra in medio disci, et puncto parvo utrinque decoratus, lateribus subtus foveolis numerosis nigris adspersus. Scutellum latiusculum, triangulare, dense cinereo-pubescens. Elytra thoracis medio paullo latiora, postice vix angustata, apice singulatim oblique truncata, nonnihil dehiscentia, supra cylindrica, obsolete alutacea, pube simili uti thorax tecta, humeris productis, callosis; in singulo lunula lata humerali, in medio fascia transversa latiore externe interrupta ibique parum dilatata, et alia intra apicem paullo angustiore integra sub-denudata interne nonnihil dilatata, fusco-nigris. Corpus subtus cylindricum, postice attenuatum, ubique densissime flavo-cinereo-pubescens; segmento anali pilis nonnullis longis obsito. Pedes graciles, elongati, ferruginei, cinereo-pubescentes, tibiis tarsisque parum dilutioribus.

Var. α. multo minor, præsertim angustior; antennis subtiter pilosis; thorace immaculato, lateribus plerumque magis

dilatato; elytris apice magis dehiscentibus cum fasciis lunulisque valde detritis.

Var. β. Præcedente dimidio fere minor et magis cylindrica; antennis fuscis, sub-glabris; thoracis macula valde detrita cum punctis lateralibus confluente.

486. *GRACILIA fasciolata* ZIEGLER. Tab. VIII. f. 4.

Linearis-elongata, fusca; thorace disco tenuiter bi-impresso; elytris crebre et rude punctatis, variolis minutis piliferis longitudinaliter remote obsitis, fascia media lata sinuata maculaque oblonga apicali testaceis.

Longit. 4 — $5\frac{1}{2}$ lin. Lat. $1\frac{1}{6} — 1\frac{1}{2}$ lin.

Callidium timidum MÉNÉTRIÉS Catalogue raisonné. p. 228. n. 1040.

Statura omnino Obrii obliqui Dej. dimidio tamen minor.

Caput porrectum, fuscum, undique minutissime sed densissime punctatum, vertice transversim pulvinatum, inter antennas impressum; antice inæqualiter profunde exaratum ibique testaceo-pilosum. Oculi atri, modice prominuli. Antennæ tenues, filiformes, corpore paullo longiores, fuscæ, apice dilutiores, pilis longis rigidis parce obsitæ; articulis omnibus apice testaceis. Thorax latitudine multo longior, fuscus, basi apiceque truncatus, margine postico valde reflexo, ante scutellum subtiliter emarginato; lateribus in medio gibbus, supra inæqualiter convexus, ante apicem transversim et in medio disci utrinque longitudinaliter leviter impressus, ubique subtiliter alutaceus, nec non granulis nonnullis vage adspersus, pube depressa testacea et pilis aliquot rigidis longis inæqualiter