

ipso rufo-marginata; margine laterali interno et tota sutura late, nec non vitta basali abbreviata angustissima in singulo fusco-nigris. Corpus subtus ampliato-cylindricum, nigrum, sub-nitidum, obsoletissime minute punctulatum, sub-coriaceum, perparce cano-pubescentis; ano ferrugineo-marginato. Pedes elongati, robusti, rufi, sub-nitidi, parce pubescentes.

491. *DORCADION glaucum* MIHL. Tab. VIII. f. 8.

Elongato-ovatum, nigrum, sub-nitidum; elytris opacis vellere glauco obtectis, margine laterali interno nigro, nitido, basi et apice vitta abbreviata fusco-atra.

Longit. $6\frac{1}{4}$ lin. Lat. $2\frac{1}{2}$ lin.

Statura et magnitudo omnino præcedentis, sed thorace brevior, antennis tenuioribus, elytrisque magis convexis etc.

Caput mediocre, sub-quadratum, nigrum, nitidum, punctis parvis sed profundis numerosis ubique vage adpersum, vertice deplanatum, inter antennis late ac minus profunde impressum, canalicula angustissima in medio disci per totam longitudinem instructum. Oculi retracti, nigro-fusci. Antennæ dimidio corporis parum longiores, nigrae, sub-tenuis, basi nitidæ, extrorsum opacæ, fusco-micantes. Thorax transversus, longitudine duplo fere latior, niger, convexus, crebre exarato-punctatus, basi ante scutellum nonnihil productus, reflexo-marginatus, apice in medio leviter emarginatus ibique subtiliter testaceo-ciliatus, lateribus spina valida, porrecta, acuta, armatus. Scutellum triangulare, nigrum, disco anteriore in medio profunde excavato. Elytra oblongo-ovata, basi late nec profunde emarginata, humeris rotundatis, haud porrectis; lateribus parum

dilatata, apice singulatim rotundata, supra fornicata, vellere glauco densissime vestita; margine laterali interno toto nigro, nitido, crebre rugoso-punctato; interdum vitta abbreviata modo ad basin et ad apicem iterum fusco-atra, opaca. Corpus subtus nigrum, nitidum, inflatum, subtiliter punctulatum, vix pubescens. Pedes robusti, breviusculi, nigri, obsolete alutacei et densius cano-pubescentes.

492. *DORCADION læve* MIHL. Tab. VIII. f. 9.

Totum atrum, supra glabrum, sub-nitidum; vertice gibbo; elytris elongato-ovatis, obsoletissime coriaceis, margine laterali interno antice alte elevato, punctato-crenato.

Longit. 7 lin. Lat. 3 lin.

Præcedenti valde affine; tamen capite thoraceque minus crebre sed rarius punctatis, elytris glabris, atris, utrinque alte marginatis præcipue differre videtur.

Caput magnum, atrum, nitidum, vage punctatum, vertice gibbum, fronte plana, longitudinaliter canaliculata. Oculi valde retracti, picei. Antennæ dimidio corporis vix longiores, crassæ, extrorsum valde attenuatæ, nigrae, subtilissime pubescentes, apice leviter infuscatæ; articulo basali sub-nudo, nitido, dense punctulato. Thorax brevis, longitudine dimidio latior, ater, sub-nitidus, basi utrinque leviter sinuatus, medio nonnihil productus, lateribus spina parva, modice acuminata armatus, apice truncatus, supra parum convexus, punctis majoribus confluentibus et paucis immixtis dense adpersus, disco longitudinaliter angustissime canaliculatus. Scutellum latiusculum, triangulare, atrum, nitidum, disco leviter impressum. Elytra oblongo-