

Fühlhörner, auch bey dem Weibchen, verhältnißmäßig länger. Ueberhaupt wird kein Naturforscher, der beide Arten zusammenhalten und vergleichen kann, ihre spezifische Verschiedenheit verkennen.

10. *Saperda nigricornis fusca*, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Fabr. Ent. syst.* 2. p. 314. n. 31. *)

Cerambyx Cardui. *Linn. Syst. nat.* 2. p. 632. n. 56.

Schrank Austr. n. 265.

Laichard. Tyr. 2. p. 37. n. 5.

Herbst Archiv. t. 26. f. 2. Foem.

Obs. Magnitudine multum variat. Antennae corpore $\frac{1}{3}$ longiores, cinereo nigroque variae, barbatae. Elytra acuminata, dehiscentia, saepe tota pulvere flavicante sparsa.

Bohnort. Häufig auf der Brenn-Nessel, *Urtica dioica* L. auch auf Disteln in der *Brigitsteau* — *Julius* —

11. *Saperda hirsutula* griseo flavescens hirsuta, thorace sublineato, elytris immaculatis, antennis fuscis unicoloribus.

Affinis habitu et statura *Sap. populneae* *Fabr.* at duplo fere minor, quasi media hanc inter et *S. nigricornem* *Fabr.* 4 — $4\frac{1}{2}$ longa.

Caput

*) Nomina trivialia in eadem specie multiplicata semper confusionem praebent, ideoque omni modo evitanda. *Fabric. Phil. entomol.* §. 33.

Caput flavicans, pilis canis valde hirsutum, obscure canaliculatum: ore oculisque nigris. Antennae corpore breviores, filiformes, crassiusculae, fuscae, unicolores, pubescentes: articulo primo griseo barbato.

Thorax griseus, hirsutus, lineis tribus flavicantibus obsoletis: intermedia tenuiore carinam mentiente, lateralibus paulo evidentioribus latioribusque.

Scutellum minutum flavescens.

Elytra convexiuscula, apice obtusa dehiscentia, punctis impressis sparsa, revera fusca, at pube tenui griseo-flava, adpressa, pilisque praeterea erectis, e cavitate punctorum impressorum emergentibus hirsutula.

Subtus tota pubescens, grisea, immaculata, pedibus concoloribus: tarsis fuscis.

Bohnort. Oesterreich. Selten.

Sie scheint mit dem *Sap. suturalis* F. nahe verwandt zu seyn, und unterscheidet sich von ihr vorzüglich durch ihre Farbe, durch die drey gelblichten Streifen des Bruststückes und die einfarbigen, greisen, punktirten Flügeldecken. Die Fühlhörner sind bey dieser Art eben so dicklicht, und kurz, wie bey dem *S. lineola* F.

12. *Saperda linearis cylindrica* nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus. *Fabr. Ent. syst.* 2. p. 309. n. 12.

Herbst Archiv. t. 26. f. 1. bona.

Caput