

Verwandte der *Ph. affinis* Panz.:

***Ph. Türki* n. sp.**

Der *Ph. affinis* sehr nahe stehend, aber die Stirne, die gelbe Aussenecke der Flügeldecken, die Brust und das bis auf die Mitte der ersten zwei bis vier Segmente röthlichgelbe Abdomen dicht goldgelb oder röthlich goldgelb tomentirt. Flügeldecken tiefschwarz. Long. 13—16 mm. — Brussa in Kleinasien.

Varietäten der *Ph. Wachanruei* Muls.:

***Ph. Wachanruei* var. *Jezabel* Reiche.**

Schwarz, Kopf und Halsschild oder nur der letztere (♂) roth gefleckt. Die Aussenecke der Flügeldecken, die Spitze der Vorderschenkel, die Vorderschienen, ein undeutlicher Ring vor der Spitze der Mittelschenkel und die Mittelschienen mit Ausnahme ihrer Spitze, eine undeutliche Makel auf der Unterseite der Hinterschenkel vor deren Spitze und die Wurzel der Hinterschienen, sowie die Basis des letzten Abdominalsegmentes oder auch die Seiten des vorletzten gelbroth. Halsschild mit zwei runden, glänzend glatten Punkten. Schildchen dicht gelblichweiss tomentirt. Flügeldecken mit feiner, bräunlichgrauer, anliegender Behaarung. — Jerusalem, Beirut.

***Ph. Wachanruei* var. *alboscuteolata* Chevr.**

Bis auf die Aussenecke der Flügeldecken, die Spitze der Vorderschenkel, die Basalhälfte der Vorderschienen und die äusserste Wurzel der Mittelschienen ganz schwarz, das Schildchen dicht weiss tomentirt, die Flügeldecken durch anliegende feine Behaarung grauschwarz. Durch Uebergangsformen ist diese Varietät vollständig mit var. *Jezabel* und durch diese mit der Stammform verbunden. — Syrien.

Verwandte der *Ph. rufimana* Schrank:

***Ph. Bethseba* Saulcy.**

Von *Ph. rufimana* nur dadurch verschieden, dass auch die ganzen Vorderbeine, sowie die Mittel- und Hinterbeine hell metallisch grün sind. Long. 8—10 mm. — Palästina. — Wahrscheinlich nur Varietät der *rufimana* Schrank.

Die folgenden Arten aus Palästina und Syrien, deren Diagnose ich hier folgen lasse, blieben mir unbekannt:

***Ph. nazarena* Reiche. Ann. Fr. Bull. 1877, p. CXXXVI.**

Linearis, nigra, indumento virescenti-griseo vestita, pilis griseisque tomentosa. Caput planiusculum, griseo-hirsutum, crebre punctatum, antennis