

Caput punctatum, fronte depresso, oculis magnis, antennis corpore paullo longioribus, basi pilosulis, apice tenuiter cinereo-pubescentibus. — *Thorax structurae S. sulphuratae, supra punctatus, punctis magnis, 4 dorsalibus quadratim dispositis, subconfluentibus, 2 lateralibus nigris.* — *Scutellum transversum.* — *Elytra thorace latiora et 6-plo longiora, linearia, apice singulatim rotundata, supra minus confertim punctata, vitta laterali, ultra medium fasciolis 2 interrupta, nigra.* — *Corpus subtus tenuissime punctulatum, minus tomentosum; pedibus longiusculis.*

In sylvis Sibiriae 3 specimina lecta, duo virescenti-tomentosa, tertium cinereo-tomentosum; abdomine crasso, ano canaliculato (femina?).

16. CLYTUS Ibex.

Niger, thorace globoso, ruguloso, elytris striola transversa, fasciis 2 angulatis apiceque rotundato flavis.

Longit. 6—7½ lin. lat. 2—2½ lin.

Tota tenue albido-pubescentia, supra opaca, subtus nitidula.

Caput punctatum, fronte convexa, 4-carinata, carinis intermediis apice connexis. — *Antennae breves, apice piceae.* — *Thorax transversus, basi apiceque truncatus et flavo-tomentosus, supra globosus, anguste rugulosus,* — *Scutellum transversum, rotundatum, margine flavo-tomentosum.* — *Elytra thorace parum latiora et 2½ longiora, linearia, postice angustiora et singulatim rotundata, supra convexa, rugulosa, striola antica transversa, fascia a scutello pone suturam usque ad medium descendente, inde angulata, transversa, altera a priori ultra medium in ipsa sutura decurrente, tum cum illa para-*

rella, margineque apicis flavo-tomentosis. — *Corpus subtus tenue punctatum, macula laterali pectoris abdominalisque segmentorum margine flavo-tomentosis.* — *Pedes longi, femoribus clavatis, rugulosis, tarsis piceis.*

Habit. in floribus montium altaicorum.

17. CLYTUS Hircus.

Niger, thorace globoso, striolis 2 albis; elytris fuscis, apice obscurioribus, fasciis 2 arcuatis albis.

Longit. 5½ lin. lat. 1½ lin.

Tenue albido-pubescentia, supra opacus, subtus nitidulus.

Caput confertim punctatum, fronte depresso; antennae breves, piceae. — *Thorax antice posticeque truncatus, lateribus dilatatus, supra parum convexus, confertissime punctulatus, striolis 2 disci sub-arcuatis, albis.* — *Elytra thorace parum latiora et 2½ longiora, linearia, apice singulatim rotundata, supra parum convexa, subtilissime alutacea, punctulo humerali obsoleto, fascia a scutello ellyptice ad humerum excurrente, alteraque obliqua, antrorsum arcuata in medio, albo-tomentosis.* — *Corpus subtus dense punctulatum; pedes longi, femoribus clavatis, basi ferrugineis, tibiis fuscis, tarsis piceis.*

Habit. cum priore.

18. PAROPSIS 12-pustulata.

Obsoleta, atra, elytris maculis 6 flavis (in vivis rufis?).

Longit. 4 lin. lat. 3 lin.

Nitida, glabra.