

(feminae?) cylindrico, ano anguste canaliculato. — *Pedes* breves, pubescentes.

Habitat in montibus altaicis rarius.

14. SAPERDA sulphurata.

Nigra, thorace striis 2, elytris punctis 4 sulphureis, pedibus testaceis.

Longit. 3½ lin. latit. ¾ lin.

Linearis, nitidula, griseo-pilosula.

Caput punctulatum, lineis 2 obliquis verticis fronteque depressa sulphureo-tomentosis. — *Oculi* magni, prominuli; *antennae* corpore longiores, cinereo-pubescentes. — *Thorax* capite angustior, longitudine non latior, cylindricus, punctatus, basi constrictus, striis 2 lateralibus maculaque ante scutellum sulphureo-tomentosis. — *Scutellum* transversum sulphureo-tomentosum. — *Elytra* thorace latiora et 4-plo longiora, ad apicem angustata, apice emarginata, supra profunde punctata, punctis 4, magnis, seriatim dispositis, sulphureo-tomentosis (anterioribus saepius detritis). — *Corpus* subtus medio tenuie, ad latera densius sulphureo-tomentosum. — *Pedes* longiusculi, laete flavo-testacei.

Habitat in Salice propre Barnaul et Smeinogorsk.

15. SAPERDA interrupta.

Nigra, pallido-tomentosa, thorace punctis 6, elytris vitta interrupta denudatis.

Longit. 4½ lin. lat. 1¼ lin.

Affinis *S. scalaris*; differt magnitudine et pubescencia. — Tota sub-nitida, pallido-tomentosa.