

13) *Piaromias* (Schonherr, novum genus, cuius typus *P. Schrenkii* Mannerh. in lit.) Karelini.

Argenteo-albo-squamulosus; thorace lateribus parum dilatato; supra deplanato, subcanaliculato, sub-ruguloso, striis 3 nudis, nigris; elytris profunde striato-punctatis, maculis multis, sub-striatum dispositis, nudis, nigris.

Long.  $4\frac{1}{2}$  lin.; lat.  $1\frac{2}{3}$  lin.

In deserto ad lac. Alakul.

14) *Piaromias inauratus*.

Pallide viridi-squamulosus, aureo-nitens; thorace subcanaliculato, supra deplanato, ruguloso, lateribus modice dilatato; elytris subtiliter striato-punctatis.

Long.  $3\frac{1}{4}$  lin.; lat. 1 lin.

Statura Eusomi; sed antennae breviores etc.

In deserto ad fl. Ajagus.

15) *Pachyta serricornis*.

Nigra, sub-pubescent; antennis sub-serratis, capite excavato; thorace lateribus tuberculato, basi depresso; elytris latis, nitidis, subtilissime alutaceis, striis 3 elevatis, obsoletis.

Long. 9 lin.; lat. 3 lin.

Affinis *P. variabilis*; sed statura capitinis, antennarum etc. satis differt.

Specimen in deserto ad lac. Alakul captum.

16) *Chrysomela songarica*

Oblongo-ovata; supra nigro-virescens, aenea; thoracis margine postice incrassato; elytris per paria seriatim punctatis, margine exteriori rufo.

Long.  $3 - 1\frac{1}{3}$  lin.; lat.  $1\frac{3}{4} - 2$  lin.

A *Ch. marginata* distinguitur colore, punctura profundiore, thoracis margine postice tantum impresso, elytris striis impressis nullis.

In deserto ad lac. Alakul duo specimina capta.

17) *Gastrophysa virescens*.

Oblongo-ovata, convexa, virescenti-aenea; thorace transverso-quadrato, foveolis punctisque impressis; elytris confertim punctatis, sub-sulcatis.

Long. maris 2 lin.; lat.  $1\frac{5}{4}$  lin.; feminae long.  $3\frac{1}{2}$  lin.; lat.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Elytra feminae abdomine multo breviora. Statura sere *G. Polygoni*, sed multo convexior.

Tria specimina lecta in vallis mont. Tarbagatai.

18) *Hippodamia scalaris*.

Oblonga; supra capite flavo, punctis 2 nigris; thorace nigro, margine antico et lateralii punctoque postico fla-

vis, singulo vittis 2 scalaribus, postice in fasciam conjunctis, nigris; subtus nigra, tibiis tarsisque flavis.

Long. 2 lin.; lat. 1 lin.

Variat lobulo vittae suturalis cum humerali confluente

Statura H. 13-punctata; an *H. amoena* Fal. Dej., mihi ignota?

Duo specimina in mont. Alatau lecta.

19) *Macraspis lineola*.

Sub-hemisphaerica; pallido-flava, oculis, punctis 2 thoracis, sutura et lineola laterali, incurva elytrorum abdominisque medio nigra.

Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.; lat. 1 lin.

Affinis *M. 12-punctatae*; sed paulo longior et aliter signata.

Duo specimina ad lac. Alakul et Nor-Saisan lecta.

## M U S É E S.

1. RAPPORT SUR LES PROGRÈS ET L'ENRICHISSEMENT DU MUSÉUM ZOOLOGIQUE ET DU MUSÉUM ZOOTOMIQUE DE L'ACADEMIE PENDANT L'ANNÉE 1841; par J.-F. BRANDT. (Lu le 4 mars 1842.)

L'année 1841 doit être regardée comme une des plus productives pour nos collections zoologiques et zootomiques depuis que j'ai l'honneur d'en être le directeur, surtout pour ce qui a rapport au complément de la Faune du pays. Il est vrai que c'est à quoi nous nous sommes principalement attachés. Depuis les acquisitions provenant des voyages de MM. le Baron de Kittlitz, Mertens, Isenbeck, Kastalski, Karelina, v. Nordmann, v. Baer et Ménétriès, voyages qui eurent lieu à différentes époques, aucune année n'avait offert un aussi grand nombre d'intéressants objets relativement à l'histoire naturelle de la Russie. Par rapport aux productions exotiques, le Muséum ne s'est pas moins enrichi, bien que le chiffre n'égalé peut-être pas celui des années précédentes.

Nous remarquerons qu'un grand nombre de ces enrichissements a été offert comme présent à l'Académie.